

重水中固氮酶催化还原乙炔产物的¹H NMR研究

陈忠,林国兴,蔡淑惠,徐昕,黄静伟,万惠霖,蔡启瑞

厦门大学化学系,厦门(361005);厦门大学物理学系,厦门(361005);厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室,厦门(361005)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 用¹H NMR研究了固氮酶在重水中催化还原乙炔的反应产物氘代乙烯.

种用群对称性对¹H NMR谱图进行了归属,计算了几种可能的C²H₂D₂

结构以及C²H₂D₃结构的NMR谱线频和强度,得出了理论谱.通过理论谱与实验谱的比较,

表明固氮酶在重水中催化还原乙炔的产物主要以顺式结构C²H₂D₂为主,并含有较多的单氘代烯.

单氘代乙烯相对乙烯的化学位移往高场移动约4.0Hz,而双氘代乙烯向高场的位移大约是单氘代乙烯的2倍左右。

关键词 [乙炔](#) [氘代乙烯](#) [催化反应](#) [固氮酶](#) [重水](#) [化学位移](#) [质子磁共振谱法](#)

分类号 [0647](#)

¹H NMR study on the products of the catalytic reduction of ethyne by nitrogenase in D₂O

Chen Zhong, Lin Guoxing, Cai Shuhui, Xu Xin, Huang Jingwei, Wan Huilin, Cai Qirui

Xiamen Univ, Dept Chem, Xiamen(361005); Xiamen Univ, Dept Phys, Xiamen (361005); State Key Lab Phys Chem Solid Surface, Xiamen Univ, Dept Chem, Xiamen(361005)

Abstract The products of the catalytic reduction ethyne by nitrogenase in D₂O were studied by ¹H NMR. In order to assign the ¹H NMR spectrum, the theoretical spectra of C₂H₂D₂ were calculated using group symmetry. The final eigenfunctions, eigenvalues, allowed transitions and intensities of C₂H₂D₂ and C₂H₂D were obtained. It can be concluded that the products comprised mainly of cis-C₂H₂D₂. There was also some C₂H₂D₃. ¹H chemical shift in C₂H₂D₃ moved by ca. 4.0 Hz to the upfield compared with that in C₂H₂D₂. The upfield shift in C₂H₂D₂ was about twice as large as that in C₂H₂D. The theoretical results are in good agreement with experimental ones.

Key words [ACETYLENE](#) [CATALYTIC REACTION](#) [NITROGENASE](#) [HEAVY WATER](#) [CHEMICAL SHIFT](#) [PROTON MAGNETIC RESONANCE SPECTROMETRY](#)

DOI:

通讯作者

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(0KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“乙炔”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [陈忠](#)
- [林国兴](#)
- [蔡淑惠](#)
- [徐昕](#)
- [黄静伟](#)
- [万惠霖](#)
- [蔡启瑞](#)