

Triassic volcanic rocks widespread in southern Lancangjiang zone of Sanjiang area. Middle-Late Triassic volcanic sequences exposed in full in Yunxian area in the north of southern Lancangjiang zone, can be divided into three formations as Middle Triassic Manghuai Formation ( $T_2m$ ), Late Triassic Xiaodingxi Formation ( $T_3x$ ) and Late Triassic Manghuihe Formation ( $T_3mh$ ) from the bottom to up. Acid volcanics mainly erupted in Manghuai Formation, formed a rhyolite and pyroclastic rock assemblage. Xiaodingxi Formation developed basic-intermediate lavas mixed with pyroclastic rocks. Rhyolite pyroclastic rocks and basalt coexist in Manghuihe Formation, showed "bimodal" volcanic features. Geochemical characteristics indicate that Triassic volcanic rocks from southern Lancangjiang zone have dual characteristics of arc volcanic rocks and continental intraplate volcanic rocks, suggesting that their formation environment is transition-type continental margin orogenic belts. Ar-Ar dating is carried on quartz andesite collected from Jinghong in the south of southern Lancangjiang zone and yields the plateau age of  $236.7 \pm 2.2$  Ma, which belong to Middle Triassic. With the dating results, the main collision stage of Lancang River is inferred in Early Triassic. Middle Triassic and early Late Triassic are respectively the stress relaxation stage after collision and continued subduction stage of oceanic basin. Until the end of Late Triassic, subduction ended, Lancang River Ocean closed." />

# 岩石学报

ACTA PETROLOGICA SINICA

[首页](#) | [学报简介](#) | [编委会](#) | [投稿指南](#) | [订阅指南](#) | [文件下载](#) | [期刊浏览](#) | [关键词检索](#) | [高级检索](#) | [联系我们](#)

王硕,董国臣,莫宣学,赵志丹,朱弟成,孔会磊,王霞,聂飞. 2012. 澜沧江南带三叠纪火山岩岩石学、地球化学特征、Ar-Ar年代学研究及其构造意义. 岩石学报, 28(4): 1148-1162

## 澜沧江南带三叠纪火山岩岩石学、地球化学特征、Ar-Ar年代学研究及其构造意义

作者	单位	E-mail
<a href="#">王硕</a>	<a href="#">中国地质大学, 北京 100083</a>	
<a href="#">董国臣</a>	<a href="#">中国地质大学, 北京 100083</a>	<a href="mailto:donggc@cugb.edu.cn">donggc@cugb.edu.cn</a>
<a href="#">莫宣学</a>	<a href="#">中国地质大学, 北京 100083</a> ; <a href="#">地质过程与矿产资源国家重点实验室, 北京 100083</a>	
<a href="#">赵志丹</a>	<a href="#">中国地质大学, 北京 100083</a> ; <a href="#">地质过程与矿产资源国家重点实验室, 北京 100083</a>	
<a href="#">朱弟成</a>	<a href="#">中国地质大学, 北京 100083</a> ; <a href="#">地质过程与矿产资源国家重点实验室, 北京 100083</a>	
<a href="#">孔会磊</a>	<a href="#">中国地质大学, 北京 100083</a>	
<a href="#">王霞</a>	<a href="#">中国地质大学, 北京 100083</a>	
<a href="#">聂飞</a>	<a href="#">中国地质大学, 北京 100083</a>	

**基金项目:** 本文受国家重点基础研究发展规划项目(2009CB421002)、111计划项目(B07011)、长江学者和创新团队发展计划(IRT1083)及中国地质调查局研究项目(1212011220920)联合资助。

### 摘要:

滇西三江地区澜沧江南带广泛发育三叠纪火山岩。在北部云县一带,中晚三叠世火山岩出露齐全,自下而上可划分为中三叠统忙怀组( $T_2m$ ),上三叠统小定西组( $T_3x$ )和上三叠统芒汇河组( $T_3mh$ )。忙怀组以酸性火山岩为主,为一套流纹岩夹火山碎屑岩组合;小定西组发育为中基性火山熔岩夹火山碎屑岩;芒汇河组具有流纹质火山碎屑岩与玄武岩共存的"双峰式"火山岩特征。地球化学特征表明,南澜沧江带三叠纪火山岩具有弧火山岩与大陆板内火山岩的双重属性,推测其形成环境为过渡型的大陆边缘造山带环境。对南澜沧江带南部景洪附近采集到的石英安山岩样品进行Ar-Ar年龄测试,得到的坪年龄为 $236.7 \pm 2.2$  Ma,为中三叠世。结合火山岩年代学结果,推测澜沧江洋主碰撞期为早三叠世,中三叠世与晚三叠世早期分别为碰撞后的应力松弛阶段与洋盆继续俯冲期,到晚三叠世末期,俯冲作用结束,澜沧江洋关闭。

**关键词:** [三叠纪](#) [弧火山岩](#) [地球化学](#) [Ar-Ar坪年龄](#) [澜沧江南带](#)

**投稿时间:** 2011/4/20 **最后修改时间:** 2011/7/10

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

您是第2173666位访问者 黔ICP备07002071号-2

主办单位: 中国矿物岩石地球化学学会 中国科学院地质与地球物理研究所 单位地址: 北京9825信箱/北京朝阳区北土城西路19号

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计

