

海南岛尖峰岭热带山地雨林及其更新群落的凋落物量与贮量

吴仲民, 卢俊培, 杜志鹄

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 本文对海南岛尖峰岭热带山地雨林及其更新群落的凋落物产量动态、各组分的变化规律及凋落物贮量进行了研究, 分析比较了这两个林分的凋落节律的异同, 并对凋落枝的收集方法进行了对比。本文指出: “双凋落峰”和“由于台风影响而产生大量非正常凋落物”是尖峰岭热带森林的两个重要的凋落特征。本项研究对深入了解热带林生态系统的功能、对热带森林资源的保护和永续利用均有重要意义。

关键词 [海南岛尖峰岭; 热带山地雨林; 森林更新; 凋](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [s18-4-2](#)

通讯作者:

吴仲民

作者个人主页: 吴仲民; 卢俊培; 杜志鹄

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (556KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“海南岛尖峰岭; 热带山地雨林; 森林更新; 凋”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [吴仲民](#)

· [卢俊培](#)

· [杜志鹄](#)