

[首 页](#)[关于本刊](#)[本刊公告](#)[下期预告](#)[投稿须知](#)[刊物订阅](#)[本刊编委](#)[编读往来](#)[联系我们](#)[English](#)

: 论文摘要 :

[返回](#)

昆虫学报, undefined 年, undefined 月, 第 undefined 卷, 第 undefined 期,  
undefined - undefined 页

题目: 中国云南省秽蝇属四新种 (双翅目: 蝇科)

作者: 薛万琦\* 佟艳丰

沈阳师范大学昆虫研究所, 沈阳 110034

摘要: 本文记述采自云南省的秽蝇属四新种, 即: ① 狭叶秽蝇 *C. angustifolia* sp. nov., 新种外形特征近似于欧洲的 *C. gracilis* Stein, 1916, 但雄各胫节基部1/5黄色, 中胫前背鬃1, 后胫后背鬃2; 雄肛尾叶和侧尾叶细长等与后者不同。② 暗腹秽蝇 *C. obscuri abdominis* sp. nov., 新种外形特征近似于长足秽蝇 *C. longipeda* Wu et Xue, 1996, 但新种胫节全黄色, 前胫中位后鬃1, 中股后腹鬃1; 第一腹板裸; 肛尾叶末端较尖等不同。③ 离叶秽蝇 *C. sparagmocerca* sp. nov., 新种外形主要特征近似于 *C. oralis* Schnabl, 1915, 但新种雄侧颜等于触角宽的1/2, 鬃角位于额角之后; 前侧片鬃2; 中股无前腹鬃, 近中位具1根长的后腹鬃, 中胫前背鬃1, 后股近中位具1根短小的毛状后腹鬃, 后胫后背鬃1; 雄肛尾叶和侧尾叶短小等不同。④ 束秽蝇 *C. sponsa* sp. nov., 该新种近似于冯氏秽蝇 *C. fengi* Yang et Zhao, 2002, 但新种额宽为头宽的0.42, 侧颜为触角宽的4/5, 口上片不突出, 鬃间距短于鬃至眼缘间距; 翅内鬃0+2; 中股基部具2~3根长的后腹鬃, 后股无明显后腹鬃, 后胫前腹鬃1, 跗节长于胫节; 腹部无明显斑条; 肛尾叶中部较宽等不同。模式标本保存在沈阳师范大学昆虫研究所。

关键词: 双翅目 蝇科 秽蝇属 新种 中国

通讯作者: 薛万琦

这篇文章摘要已经被浏览 63 次, 全文被下载 0 次。

您是第: **348389** 位访问者

《昆虫学报》编辑部

地 址: 北京北四环西路25号, 中国科学院动物研究所

邮 编: 100080

电 话: 010-82872092

传 真: 010-62569682

E-mail: [kxcb@ioz.ac.cn](mailto:kxcb@ioz.ac.cn)

网 址: <http://www.insect.org.cn>