

科学家或发现鱼鳍向四肢进化关键基因

这两个基因在鱼鳍发育过程中起关键作用，在动物四肢中没有出现

科学家在最新一期的《自然》杂志中报道称，有两个基因在鱼鳍的发育过程中起关键作用，但它们在动物的四肢中却没有出现，失去这两个基因或许是从鱼鳍进化到动物四肢的“关键步骤”。

加拿大渥太华大学玛丽-安德烈-艾金门科领导的团队进行了这项研究。她们从研究斑马鱼胚胎的发育入手，发现了两个关键基因。这两个基因编码的蛋白质对鱼鳍的结构非常重要，它们是角质鳍条的组成部分，角质鳍条在鱼卵中可以看到，随着鱼的不断成熟，它们就发育为多骨的鳍条。

研究人员表示，但在动物的四肢中却没有对应的基因。为了确认这一点，他们在象鼻鲨的基因组中也找到了同样的基因，象鼻鲨是一种非常基础的鱼类，这表明这些古老的基因一直在有骨头的鱼体内存在，这些鱼在进化成四足动物时失去了这些基因。

为了更详细地研究这些变化，科学家控制了斑马鱼的发育过程。他们抑制了一个正在发育的斑马鱼胚胎中的这两个基因的活性，结果发现，该斑马鱼长出了“被截了一段”的较短鱼鳍，而且，鱼鳍上没有多骨的鳍条。

研究人员认为，这表明，失去这些基因是从鱼鳍进化到四肢的一个关键步骤。

该研究团队也将正常的斑马鱼胚胎的发育过程同老鼠胚胎的发育过程相比较。艾金门科表示，鱼鳍的发育同动物四肢的发育最初非常相似，但是，当这两个基因开始表达时，它们的发育开始出现差异。

[更多阅读](#)

[《自然》发表论文摘要（英文）](#)

特别声明：本文转载仅仅是出于传播信息的需要，并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性；如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用，须保留本网站注明的“来源”，并自负版权等法律责任；作者如果不希望被转载或者联系转载稿费事宜，请与我们联系。

[打印](#) [发E-mail给:](#)



以下评论只代表网友个人观点，不代表科学网观点。

2010-6-28 13:48:24 匿名 IP:180.109.45.*

疑问，鲸、海豚等哺乳动物，是四肢进化成鳍还是鳍进化成四肢？鱼类亦如此

[\[回复\]](#)

2010-6-28 13:19:31 jjjianjia IP:

题不对文

[\[回复\]](#)

2010-6-28 11:17:20 EroControl IP:

强大，“我要爬”基因居然都被发现了~~

[\[回复\]](#)

目前已有3条评论

