

黄志英 北京 北京工业大学化学与环境工程系 100022

郭清贤 北京 北京工业大学化学与环境工程系 100022

赵红宇 北京 北京工业大学化学与环境工程系 100022

杨圣杰 北京 北京工业大学化学与环境工程系 100022

摘要: 本文利用自制简易氢化物发生装置,将普通常压湿法消化后的食品、饮料及加标矿泉水试样进行常规火焰原子吸收光谱法分析。本法简便、快速,廉价且易于推广。对于上述试样的分析结果令人满意,加标回收率在85%~115%之间,相对标准偏差不超过6.0%。

关键词:

文章全文为PDF格式,请下载至本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器,请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

[Determination of Se and As by Simple HG-FAAS in Food, Drinking & Mineral Water](#)

100022

100022

100022

100022

Abstract: Se and As in food, drinking, and mineral water samples were determined by simple HG-AAS after the sample dissolving technology using nitric acid and perchloric acid. The method was simple, fast, cheap and easy to operate. The analytical results of these samples were satisfactory, the recoveries were between 85%-115% and the RSD of the determination were less than 6.0%.

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]