



### 内蒙古浑善达克地区黑线仓鼠的食性及其动态

彭真<sup>1, 2</sup>, 王勇<sup>1</sup>, 范尊龙<sup>1, 2</sup>, 李亚衡<sup>1, 2</sup>, 徐云虎<sup>3</sup>, 贺兵<sup>3</sup>, 王玉梅<sup>4</sup>, 赵景瑞<sup>5</sup>

1 中国科学院亚热带农业生态研究所, 亚热带农业生态过程重点实验室, 湖南 长沙 410125;

2 中国科学院大学, 北京 100049;

3 内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗草原工作站;

4 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗气象局;

5 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗土壤肥料工作站

Food consumption of striped hamster (*Cricetulus barabensis*) and its dynamic changes in Hunshandake sandy land of Inner Mongolia, China

PENG Zhen<sup>1,2</sup>, WANG Yong<sup>1</sup>, FAN Zun-long<sup>1,2</sup>, LI Ya-heng<sup>1,2</sup>, XU Yun-hu<sup>3</sup>, HE Bing<sup>3</sup>, WANG Yu-mei<sup>4</sup>, ZHAO Jing-rui<sup>5</sup>

1 Key Laboratory for Agro-Ecological Processes in Subtropical Region, Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha 410125, Hunan Province, China;

2 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3 Xianghuangqi Research Station of Grassland;

4 Taipusi Banner Meteorological Bureau, Inner Mongolia Taipusi Banner;

5 Taipusi Banner Agency for Soil and Fertilizer, Inner Mongolia Taipusi Banner

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(15\)](#)