

## 论文

## AFLP标记分析生活力影响大豆中黄18品质遗传完整性

王栋, 张志娥, 陈晓玲, 辛霞, 辛萍萍, 卢新雄\*

中国农业科学院作物科学研究所/农作物基因资源与基因改良国家重大科学工程, 北京100081

摘要:

以中黄18种子为试验材料, 采用不同时间(0、112、154和196 d)老化处理, 获得4个群体G<sub>0</sub>-1、G<sub>0</sub>-2、G<sub>0</sub>-3和G<sub>0</sub>-4, 其发芽率分别为98.0%、95.0%、81.0%和79.0%。将这4个群体进行2次田间繁殖, 得到4个繁殖一代群体G<sub>1</sub>-1、G<sub>1</sub>-2、G<sub>1</sub>-3和G<sub>1</sub>-4及4个繁殖二代群体G<sub>2</sub>-1、G<sub>2</sub>-2、G<sub>2</sub>-3和G<sub>2</sub>-4。以群体G<sub>0</sub>-1为对照, 选用12对AFLP引物组合分析12个群体的遗传完整性。结果显示, 所有处理群体与对照群体G<sub>0</sub>-1的等位基因频率t检验概率值均为1.00, 即无显著差异。群体G<sub>2</sub>-4与对照群体G<sub>0</sub>-1的遗传相似系数仍高达0.9333, 表明发芽率为79.0%群体的繁殖二代群体与对照群体的遗传相似性仍然较高。显著性t检验结果显示, 与对照群体G<sub>0</sub>-1相比, 群体G<sub>1</sub>-1、G<sub>2</sub>-1、G<sub>1</sub>-2和G<sub>2</sub>-2的每位点有效等位基因数(Ae)、遗传多样性指数(H)和香农指数(I)差异不显著; 群体G<sub>0</sub>-3、G<sub>0</sub>-4、G<sub>1</sub>-3、G<sub>1</sub>-4、G<sub>2</sub>-3和G<sub>2</sub>-4的上述遗传多样性参数则显著降低。与对照群体G<sub>0</sub>-1相比, 群体G<sub>1</sub>-1、G<sub>2</sub>-1、G<sub>1</sub>-2和G<sub>2</sub>-2的稀有等位基因数无显著变化; 而群体G<sub>0</sub>-3、G<sub>0</sub>-4、G<sub>1</sub>-3、G<sub>1</sub>-4、G<sub>2</sub>-3和G<sub>2</sub>-4的稀有等位基因数则大幅下降。以上结果表明, 与对照群体相比, 由发芽率分别为98.0%和95.0%的群体更新的子代群体, 其群体遗传多样性和稀有等位基因数无显著变化, 而由发芽率分别为81.0%和79.0%的群体更新的子代群体, 则显著下降。因此, 生活力下降比繁殖世代对大豆种质群体的遗传结构影响更大, 建议初始发芽率为98.0%的大豆种质更新发芽率标准不应低于81.0%。

关键词: 大豆 生活力 繁殖世代 AFLP 遗传完整性 种质保存

## Analysis of Viability Affecting on Genetic Integrity in Soybean Germplasm Zhong Huang 18 by AFLP Markers

Institute of Crop Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences / National Key Facility for Crop Gene Resources and Genetic Improvement, Beijing 100081, China

Institute of Crop Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences / National Key Facility for Crop Gene Resources and Genetic Improvement, Beijing 100081, China

## Abstract:

Using low temperature genebank is a main way for conserving crop germplasm resources. However, with the extension of storage time, the viability of seeds stored in the genebank will inevitably decline. Therefore, preserved seeds need to be regenerated periodically. In this study, soybean cultivar Zhonghuang 18 was used as a material and aged for different days (0, 112, 154, and 196 d) to obtain four populations G<sub>0</sub>-1, G<sub>0</sub>-2, G<sub>0</sub>-3, and G<sub>0</sub>-4. The germination percentages of the four populations were 98.0%, 95.0%, 81.0%, and 79.0%, respectively. These populations were regenerated twice in the field. The first descendant populations were marked as G<sub>1</sub>-1, G<sub>1</sub>-2, G<sub>1</sub>-3, and G<sub>1</sub>-4, and the second were marked as G<sub>2</sub>-1, G<sub>2</sub>-2, G<sub>2</sub>-3, and G<sub>2</sub>-4, respectively. Population G<sub>0</sub>-1 was taken as the control. The genetic variation between the control and treated populations was detected using AFLP marker. Sixty individual seedlings derived from each population were detected by 12 AFLP primer combinations. The result showed that t-test probability values for allele frequencies were 1.00 between the control and treated populations, which indicated that there was no significant difference in the allele frequencies of the treated population compared with the control. The genetic similarity coefficient between population G<sub>2</sub>-4 and G<sub>0</sub>-1 was 0.9333, which manifested high genetic similarity between these two populations. The results of t-test showed that there was no significant difference in effective number of alleles per loci (Ae), index of genetic diversity (He), Shannon's information index (I) between the control G<sub>0</sub>-1 and G<sub>1</sub>-1, G<sub>2</sub>-1, G<sub>1</sub>-2, and G<sub>2</sub>-2. The index values of Ae, He, and I for the populations of G<sub>0</sub>-3, G<sub>0</sub>-4, G<sub>1</sub>-3, G<sub>1</sub>-4, G<sub>2</sub>-3, and G<sub>2</sub>-4 declined significantly compared with those of the control G<sub>0</sub>-1. The number of rare alleles for the populations G<sub>1</sub>-1, G<sub>2</sub>-1, G<sub>1</sub>-2, and G<sub>2</sub>-2 did not change significantly compared with that for the control G<sub>0</sub>-1 while that for populations of G<sub>0</sub>-3, G<sub>0</sub>-4, G<sub>1</sub>-3, G<sub>1</sub>-4, G<sub>2</sub>-3, and G<sub>2</sub>-4 declined greatly. Above results showed that the genetic diversity and the number of rare alleles for the descendant population of the populations with 98.0% and 95.0% germination percentages did

## 扩展功能

## 本文信息

▶ Supporting info

▶ PDF(293KB)

▶ [HTML全文]

▶ 参考文献

## 服务与反馈

▶ 把本文推荐给朋友

▶ 加入我的书架

▶ 加入引用管理器

▶ 引用本文

▶ Email Alert

▶ 文章反馈

▶ 浏览反馈信息

## 本文关键词相关文章

▶ 大豆

▶ 生活力

▶ 繁殖世代

▶ AFLP

▶ 遗传完整性

▶ 种质保存

## 本文作者相关文章

not change significantly compared with those for the control G<sub>0</sub>-1, but declined significantly for the populations with 81.0% and 79.0% germination percentages. Therefore, the viability decline had a greater impact on the genetic composition of soybean population than the regeneration times. It was recommended that soybean seeds with initial germination percentage of 98.0% should be regenerated before its germination percentage declined to 81.0%.

Keywords: Soybean Viability Regeneration AFLP Genetic integrity Germplasm conservation

收稿日期 2009-11-02 修回日期 2010-01-05 网络版发布日期 2010-01-22

DOI:

基金项目:

本研究由国际科技支撑计划项目（2006BAD13B10）和农业部财政专项（2130135）资助。

通讯作者: 卢新雄, E-mail: xxlu@caas.net.cn, Tel: 010-62174099

作者简介:

参考文献:

本刊中的类似文章

1. 王英;吴存祥;张学明;王云鹏;韩天富.不同光周期条件下大豆生育期主基因的效应[J].作物学报, 2008, 34(07): 1160-1168
2. 吴影;宋丰顺;陆徐忠;赵伟;杨剑波;李莉.实时荧光PCR技术定量检测转基因大豆方法的研究[J].作物学报, 2007, 33(10): 1733-1737
3. 周斌;赵团结;喻德跃;邢邯;陈受宜;盖钧镒.大豆抗筛豆龟蝽*Megacota cribraria* (Fabricius)的QTL分析[J].作物学报, 2008, 34(03): 361-368
4. 吴琼;齐照明;刘春燕;胡国华;陈庆山.基于元分析的大豆生育期QTL的整合[J].作物学报, 2009, 35(8): 1418-1424
5. 关荣霞, 陈玉波, 方宏亮, 刘硕, 腾卫丽, 李文滨, 王丕武, 常汝镇, 邱丽娟.中品95-5117抗大豆花叶病毒基因源分析[J].作物学报, 0, () : 0-
6. 张军;赵团结;盖钧镒.我国黄淮和南方主要大豆育成品种家族产量和品质优异等位变异在系谱中遗传的研究[J].作物学报, 2009, 35(2): 191-202
7. 林植芳;彭长连;林桂珠.大豆和小麦不同基因型的碳同位素分馏作用及水分利用效率[J].作物学报, 2001, 27(04): 409-414
8. 冯虎元;安黎哲;徐世健;强维亚;陈拓;王勋陵.紫外线-B辐射增强对大豆生长、发育、色素和产量的影响[J].作物学报, 2001, 27(03): 319-323
9. 钱虎君;盖钧镒;喻德跃.大豆豆乳产量、品质及加工性状的遗传变异和遗传规律研究[J].作物学报, 2001, 27(06): 880-885
10. 雷勃钧;钱华;李希臣;卢翠华;周思君;韩玉琴;刘昭军;刘广阳;杨兴勇;董全中;赵凯;赫世涛.通过直接引入外源DNA育成高产、优质、高蛋白大豆新品种黑生101[J].作物学报, 2000, 26(06): 725-730
11. 刘珊珊;田福东;高丽辉;王志坤;葛玉君;刁桂珠;李文滨.大豆7S球蛋白亚基组成对品质性状的影响[J].作物学报, 2008, 34(05): 909-913
12. 韩锁义;张恒友;杨玛丽;赵团结;盖钧镒;喻德跃.大豆“南农86-4”突变体筛选及突变体库的构建[J].作物学报, 2007, 33(12): 2059-2062
13. 瞿瑛;刘素红;谢云.植被覆盖度计算机模拟模型与参数敏感性分析[J].作物学报, 2008, 34(11): 1964-1969
14. 李林海;邱丽娟;常汝镇;贺学礼.中国黄淮和南方夏大豆(*Glycine max L.*) SSR标记的遗传多样性及分化研究[J].作物学报, 2005, 31(06): 777-783
15. 关荣霞;郭娟娟;常汝镇;邱丽娟.国外种质对中国大豆育成品种遗传贡献的分子证据[J].作物学报, 2007, 33(09): 1393-1398
16. 于月华;陈明;李连城;徐兆师;刘阳娜;曲延英;曹新有;马有志.大豆(*Glycine max*) GmDREB5互作蛋白GmGβ1的筛选及鉴定[J].作物学报, 2008, 34(10): 1688-1695
17. 曾维英;杨守萍;喻德跃;盖钧镒.大豆质核互作雄性不育系NJCMS2A及其保持系的花药蛋白质组比较研究[J].作物学报, 2007, 33(10): 1637-1643
18. 汪潇琳;陈艳萍;喻德跃.MADS-box基因GmAGL15在大豆种子发育过程中的表达[J].作物学报, 2008, 34(02): 330-332
19. 杨飞;张柏;宋开山;王宗明;刘焕军;杜嘉.玉米和大豆光合有效辐射吸收比例与植被指数和叶面积指数的关系[J].作物学报, 2008, 34(11): 2046-2052
20. 邢光南;赵团结;盖钧镒.大豆对豆卷叶螟*Lamprosema indicata* (Fabricius)抗性的遗传分析[J].作物学报, 2008, 34(01): 8-16

21. 文自翔;赵团结;郑永战;刘顺湖;王春娥;王芳;盖钧镒.中国栽培和野生大豆农艺品质性状与SSR标记的关联分析  
I. 群体结构及关联标记[J]. 作物学报, 2008,34(07): 1169-1178
22. 李秀侠;王振华;时立波;吴海燕;毕建杰;李多川.大豆根内胞囊线虫的时空动态研究[J]. 作物学报, 2008,34(12): 2190-2195
23. 宁慧霞;李英慧;刘章雄;常汝镇;关荣霞;罗淑萍;邱丽娟.大豆品种成熟期基因型推测的研究[J]. 作物学报, 2008,34(03): 382-387
24. 张红梅;周斌;赵团结;邢邯;陈受宜;盖钧镒.大豆重组自交系群体NJRISX豆腐和豆乳得率的QTL分析[J]. 作物学报, 2008,34(01): 67-75
25. 李福山;李向华.野生大豆在自然界中光温反应的规律[J]. 作物学报, 2003,29(05): 670-675
26. 李荣峰;蔡妙珍;刘鹏;徐根娣;梁和;周主贵.边缘细胞对大豆根尖铝毒害的缓解[J]. 作物学报, 2008,34(02): 318-325
27. 熊冬金;赵团结;盖钧镒.1923—2005年中国大豆育成品种种质的地理来源及其遗传贡献[J]. 作物学报, 2008,34(02): 175-183
28. 王继安;杨庆凯.土壤肥力对大豆杂交后代选择效果的影响[J]. 作物学报, 2001,27(04): 460-464
29. 李卫东;卢为国;梁慧珍;王树峰;苑保军;耿臻;王素阁;范彦英;刘亚非;王令涛.大豆籽粒维生素E含量与生态因子关系的研究[J]. 作物学报, 2007,33(07): 1094-1099
30. 杨秀红;吴宗璞;张国栋.大豆品种根系性状与地上部性状的相关性研究[J]. 作物学报, 2002,28(01): 72-75
31. 宁海龙;李文霞;王继安;陈庆山;孔凡江;张淑珍;杨庆凯.黑龙江省大豆蛋白质油分及蛋白质组分类型[J]. 作物学报, 2003,29(04): 551-556
32. 麻浩;盖钧镒;张国正;官春云;丁安林.大豆种子脂肪氧合酶缺失体类型的加工特性研究[J]. 作物学报, 2003,29(02): 290-294
33. 满为群;杜维广;张桂茹;李卫华;宋晓燕;戈巧英;郝乃斌;陈怡.高光效大豆几项光合生理指标的研究[J]. 作物学报, 2003,29(05): 697-700
34. 王嵒;T Clemente;王连铮;辛世文;黄其满.大豆品种的再生性能及对EHA 101农杆菌的敏感性[J]. 作物学报, 2003,29(05): 664-669
35. 邱丽娟, 李英慧, 关荣霞, 刘章雄, 王丽侠, 常汝镇.大豆核心种质和微核心种质的构建、验证与研究进展[J]. 作物学报, 2009,35(4): 571-579
36. 李海燕;朱延明;刘北东;张彬彬;张淑珍.大豆幼胚子叶体细胞胚诱导主要影响因素的研究[J]. 作物学报, 2002,28(06): 852-856
37. 颜清上;王连铮.“抗病值”在大豆抗孢囊线虫病遗传研究中应用的探讨[J]. 作物学报, 2000,26(01): 20-27
38. 孙祖东;盖钧镒.大豆抗斜纹夜蛾幼虫的遗传研究[J]. 作物学报, 2000,26(03): 341-346
39. 宋亚娜;王贺;李春俭;张福锁.小麦大豆间作对大豆根系质外体铁库累积与利用的影响[J]. 作物学报, 2000,26(04): 462-466
40. 董英山;庄炳昌;赵丽梅;孙寰;张明;何孟元.中国野生大豆遗传多样性中心[J]. 作物学报, 2000,26(05): 521-527
41. 徐冉;陈存来;邵历;张礼凤;王彩洁;李永孝.夏大豆叶片光合作用与光强的关系[J]. 作物学报, 2005,31(08): 1080-1085
42. 杨守萍;盖钧镒;徐汉卿.大豆雄性不育突变体NJ89-1的细胞学研究[J]. 作物学报, 1999,25(06): 663-668
43. 智海剑;盖钧镒;何小红.大豆对SMV抗侵染与抗扩展的遗传分析[J]. 作物学报, 2005,31(10): 1260-1264
44. 韩粉霞;户田恭子;中村善行;李桂英;孙君明.大豆籽粒蛋白质和磷含量及凝固剂浓度对豆腐加工品质的影响[J]. 作物学报, 2005,31(07): 908-914
45. 刘莹;盖钧镒;吕慧能.大豆根区逆境耐性的种质鉴定及其与根系性状的关系[J]. 作物学报, 2005,31(09): 1132-1137
46. 关荣霞;常汝镇;邱丽娟;刘章雄;郭顺堂.栽培大豆蛋白亚基11S/7S组成及过敏蛋白缺失分析[J]. 作物学报, 2004,30(11): 1076-1079
47. 郑殿峰;赵黎明;冯乃杰.植物生长调节剂对大豆叶片内源激素含量及保护酶活性的影响[J]. 作物学报, 2008,34(07): 1233-1239
48. 金剑;刘晓冰;王光华;Stephen J Herbert.不同熟期及产量类型的大豆生殖生长期生理特性的比较研究[J]. 作物学报, 2004,30(12): 1225-1231
49. 卢为国;盖钧镒;郑永战;李卫东.大豆遗传图谱的构建和抗胞囊线虫(*Heterodera glycines Ichinohe*)的QTL分析[J]. 作物学报, 2006,32(09): 1272-1279
50. 郝耕;陈杏娟;卜慕华.中国大豆品种生育期组的划分[J]. 作物学报, 1992,18(04): 275-281
51. 王修兰;徐师华.CO<sub>2</sub>浓度倍增对大豆各生育期阶段的光合作用及干物质积累的影响[J]. 作物学报, 1994,20(05): 520-527
52. 邹冬生;郑丕尧.大豆生育过程中主茎叶片光合、蒸腾、呼吸及水导性的动态研究[J]. 作物学报, 1993,19(04): 342-351
53. 李明春;蔡易;赵桂兰;财音青格乐;周皓;孙伟;邢来君.改良大豆子叶节再生体系的研究[J]. 作物学报, 2006,32(02): 223-227
54. 王春娥;赵团结;盖钧镒.中国栽培和野生大豆豆腐与豆乳得率的遗传变异[J]. 作物学报, 2007,33(12): 1928-1934
55. 张含彬;任万军;杨文钰;伍晓燕;王竹;杨继芝.不同施氮量对套作大豆根系形态与生理特性的影响[J]. 作物学报,

- 2007,33(01): 107-112
56. 张伟; 谢甫绵; 宋显军; 张惠君; 王海英. 大豆上部节位叶片生产效率的初步研究[J]. 作物学报, 2007, 33(05): 853-856
57. 杨兰芳; 蔡祖聪; 祁士华. 大豆和玉米生长对土壤N<sub>2</sub>O排放的影响[J]. 作物学报, 2007, 33(05): 861-865
58. 崔世友; 喻德跃. 大豆不同生育时期叶绿素含量QTL的定位及其与产量的关联分析[J]. 作物学报, 2007, 33(05): 744-750
59. 关媛; 鄂文弟; 王丽侠; 关荣霞; 刘章雄; 常汝镇; 曲延英; 邱丽娟. 以湖南和湖北大豆[Glycine max (L.) Merr.]为例分析影响遗传多样性评价的因素[J]. 作物学报, 2007, 33(03): 461-468
60. 宁海龙; 李文霞; 李文滨. 大豆脂肪酸组分的胚、细胞质和母体遗传效应分析[J]. 作物学报, 2006, 32(12): 1873-1877
61. 徐杰; 胡国华; 张大勇; 孙殿君; 刘春燕; 裴宇峰. 大豆籽粒发育过程中脂肪酸组分的累积动态[J]. 作物学报, 2006, 32(11): 1759-1763
62. 王竹; 杨文钰; 吴其林. 玉/豆套作荫蔽对大豆光合特性与产量的影响[J]. 作物学报, 2007, 33(09): 1502-1507
63. 李葳; 朱保葛; 徐民新; 张利明; 陈修文; 马文平; 智艳阳. 矮秆和半矮秆大豆突变体植株生长对外源GA<sub>3</sub>的响应[J]. 作物学报, 2008, 34(07): 1240-1246
64. 郭玉双; 张艳菊; 朱延明; 李杰; 柏锡; 张淑珍; 吴书音; 李海燕. 转几丁质酶和核糖体失活蛋白双价基因大豆的获得与抗病性鉴定[J]. 作物学报, 2006, 32(12): 1841-1847
65. 郑永战; 盖钧镒; 卢为国; 李卫东; 周瑞宝; 田少君. 大豆脂肪及脂肪酸组分含量的QTL定位[J]. 作物学报, 2006, 32(12): 1823-1830
66. 范爱颖, 王晓鸣, 方小平, 武小菲, 朱振东. 大豆品种豫豆25抗疫霉根腐病基因的鉴定[J]. 作物学报, 2009, 35(10): 1844-1850
67. 赵团结; 盖钧镒. 大豆不育细胞质资源的发掘与鉴定[J]. 作物学报, 2006, 32(11): 1604-1610
68. 田佩占; 孙志强; 王继安; 阎日红. 大豆亲本杂交方式对后代的遗传变异及品系产量表现的影响[J]. 作物学报, 1993, 19(01): 76-82
69. 崔世友; 耿雷跃; 孟庆长; 喻德跃. 大豆苗期耐低磷性及其QTL定位[J]. 作物学报, 2007, 33(03): 378-383
70. 傅金民; 张庚灵; 苏芳; 王振林; 董燕; 史春余. 大豆籽粒形成期14C同化物的分配和源库调节效应的研究[J]. 作物学报, 1999, 25(02): 169-173
71. 许守民; 苗以农; 姜艳秋; 胡阿林; 佟德娟; 王英典; 朱长甫; 刘学军. 大豆不同生殖生长时期不同冠层光合活性差异与叶片结构关系的探讨[J]. 作物学报, 1992, 18(03): 191-195
72. 朱振东; 霍云龙; 王晓鸣; 黄俊斌; 武小菲. 一个抗大豆疫霉根腐病新基因的分子鉴定[J]. 作物学报, 2007, 33(01): 154-157
73. 韩秉进. 改善空间因子对大豆生长及产量的影响[J]. 作物学报, 2006, 32(07): 1097-1100
74. 马伯军; 潘建伟; 傅昭娟; 张萍华; 朱睦元. 大豆根边缘细胞的发育及其影响因子[J]. 作物学报, 2005, 31(02): 165-169
75. 韩天富; 盖钧镒. 大豆几种光周期处理效应的植物激素解析[J]. 作物学报, 1999, 25(03): 349-355
76. 李星华; 陈宛妹; 增禄. 夏大豆主要农艺性状基因效应分析[J]. 作物学报, 1991, 17(06): 453-460
77. 蒋工颖; 董钻. 大豆养分吸收动态及施肥效果的研究[J]. 作物学报, 1989, 15(02): 167-173
78. 郭顺堂; 孟岩; 张雪梅; 张晓雷; 齐静; 邱丽娟; 常汝镇. 中国大豆蛋白亚基构成分析与缺失部分亚基的特异大豆品种的筛选[J]. 作物学报, 2006, 32(08): 1130-1134
79. 战勇; 喻德跃; 陈受宜; 盖钧镒. 大豆对SMV SC-7株系群的抗性遗传与基因定位[J]. 作物学报, 2006, 32(06): 936-938
80. 薛仁镐. 用根瘤农杆菌介导法转化大豆萌动子叶节细胞[J]. 作物学报, 2006, 32(08): 1188-1192
81. Amarasinghe A A Y; 杨跃生. 无细胞分裂素培养基上高效的大豆下胚轴外植体器官再生[J]. 作物学报, 2006, 32(08): 1204-1208
82. 梁慧珍; 李卫东; 曹颖妮; 王辉. 大豆籽粒异黄酮含量的遗传效应研究[J]. 作物学报, 2006, 32(06): 856-860
83. 王贤智; 张晓娟; 周蓉; 沙爱华; 吴学军; 蔡淑平; 邱德珍; 周新安. 大豆重组自交系群体荚粒性状的QTL分析[J]. 作物学报, 2007, 33(03): 441-448
84. 邢光南; 赵团结; 盖钧镒. 大豆资源的筛豆龟蝽[Megacotona cribraria (Fabricius)]抗性鉴定[J]. 作物学报, 2006, 32(04): 491-496
85. 孙德生; 李文滨; 张忠臣; 陈庆山; 杨庆凯. 大豆株高QTL发育动态分析[J]. 作物学报, 2006, 32(04): 509-514
86. 卢为国; 盖钧镒; 李卫东. 大豆对胞囊线虫(Heterodera glycines Ichinohe) 1号和4号生理小种抗性的遗传分析[J]. 作物学报, 2006, 32(05): 650-655
87. 张跃强; 关荣霞; 刘章雄; 常汝镇; 姚源松; 邱丽娟. 利用大豆核心种质部分样本鉴定28K和30K过敏蛋白缺失材料[J]. 作物学报, 2006, 32(03): 324-329
88. 张玉东; 盖钧镒; 马育华. 大豆对两个大豆花叶病毒本地株系抗性的遗传研究[J]. 作物学报, 1989, 15(03): 213-220
89. 丁安林; 刘立军; 傅翠真; 常汝镇. 大豆中脂肪氧化酶同功酶的鉴定研究[J]. 作物学报, 1994, 20(03): 373-374
90. 邵桂花; 常汝镇; 陈一舞; 闫淑荣. 大豆耐盐性遗传的研究[J]. 作物学报, 1994, 20(06): 721-726
91. 许长成; 邹琦. 大豆叶片早促衰老与其与膜脂过氧化的关系[J]. 作物学报, 1993, 19(04): 359-364

92. 李晓梅; 吴存祥; 马启彬; 张胜; 李春林; 张新英; 韩天富. 大豆品种自贡冬豆花芽分化及开花逆转过程的形态解剖学研究[J]. 作物学报, 2005, 31(11): 1437-1442
93. 杨玲; 王韶唐. 大豆近轴和远轴叶面特征与其高度避日性取向的生理意义[J]. 作物学报, 1999, 25(01): 86-91
94. 王庆祥; 吕桂兰; Feng Zhang; Donald L. Smith. GA3和kinetin在低温下对玉米和大豆种子萌发及幼苗发育影响的研究[J]. 作物学报, 1999, 25(03): 363-372
95. 盖钧镒; 许东河; 高忠; 岛本义也; 阿部纯; 福士泰史; 北岛俊二. 中国栽培大豆和野生大豆不同生态类型群体间遗传演化关系的研究[J]. 作物学报, 2000, 26(05): 513-520
96. 王永军; 吴晓雷; 喻德跃; 章元明; 陈受宜; 盖钧镒. 重组自交系群体的检测调整方法及其在大豆NJRIKY群体的应用[J]. 作物学报, 2004, 30(05): 413-418
97. 崔艳华; 邱丽娟; 常汝镇; 吕文河. 黄淮夏大豆(*G. max*)初选核心种质代表性检测[J]. 作物学报, 2004, 30(03): 284-288
98. 曹越平; 杨庆凯. 人工接种与疫区诱发条件下大豆对灰斑病的抗性及后代选择研究[J]. 作物学报, 2002, 28(05): 680-685
99. 於丙军; 罗庆云; 刘友良. 盐胁迫对盐生野大豆生长和离子分布的影响[J]. 作物学报, 2001, 27(06): 776-780
100. 庄炳昌; 徐豹. 萌发过程中大豆(*G. max*)种子蛋白组分变化的研究[J]. 作物学报, 1988, 14(03): 232-235
101. 李桂兰; 乔亚科; 杨少辉; 靳朝霞; 李明刚. 农杆菌介导大豆子叶节遗传转化的研究[J]. 作物学报, 2005, 31(02): 170-176
102. 盖钧镒; 汪越胜; 张孟臣; 王继安; 常汝镇. 中国大豆品种熟期组划分的研究[J]. 作物学报, 2001, 27(03): 286-292
103. 徐豹; 邹淑华; 庄炳昌; 林忠平; 赵玉锦. 野生大豆(*G. soja*)种子贮藏蛋白组份 11S/7S 的研究[J]. 作物学报, 1990, 16(03): 235-241
104. 余建章; Reid G. Palmer. 大豆的一个新三体[J]. 作物学报, 1989, 15(04): 397-304
105. 傅骏骅; 李连城; 菡红丽; 岳绍先; 朱立煌. 抗阿特拉津(Atrazine)转基因大豆植株的田间检测表现[J]. 作物学报, 1993, 19(06): 497-500
106. 吕景良; 邵荣春; 吴百灵; 梁岐; 吴桂荣. 东北地区大豆品种资源脂肪酸组成的分析研究[J]. 作物学报, 1990, 16(04): 349-356
107. 姜彦秋; 黄峻; 苗以农. 大豆叶片表面结构与蒸腾的关系[J]. 作物学报, 1991, 17(01): 42-46
108. 肖文言; 王连铮. 大豆幼茎子叶原生质体培养及植株再生[J]. 作物学报, 1994, 20(06): 665-669
109. 高辉远; 陈敬锋; 邹琦; 程炳嵩. 大豆光合午休原因的分析[J]. 作物学报, 1994, 20(03): 357-362
110. 陈一舞; 常汝镇; 邵桂花; 闫淑荣. 盐胁迫下大豆超氧化物歧化酶的变化[J]. 作物学报, 1994, 20(03): 363-367
111. 吕慧能; 盖钧镒; 马育华; 卫志明; 许智宏. 不同激素条件下大豆原生质体培养和植株再生[J]. 作物学报, 1993, 19(04): 328-333
112. 杨永华; 盖钧镒; 马育华. 大豆生育期光温反应特性的遗传[J]. 作物学报, 1994, 20(02): 144-148
113. 邱丽娟; 王金陵; 孟庆喜. 大豆蛋白质间接选择方法的初步研究[J]. 作物学报, 1994, 20(03): 316-321
114. 庄炳昌; 徐豹; 王玉民. 大豆生化遗传研究—— I . 超氧化物歧化酶谱型 I 和谱型III的遗传[J]. 作物学报, 1992, 18(02): 126-131
115. 丁安林; 杜文卿; 常汝镇. 不含 SBT1-A\_2 的基因导入我国大豆的遗传表达[J]. 作物学报, 1990, 16(01): 26-31
116. 宋启建; 盖钧镒; 马育华. 大豆品种蛋白质、油分含量在杂种后代的优势表现及分离变异[J]. 作物学报, 1994, 20(05): 542-547
117. 朱洪德; 余建章; 周可金; 李贺; 徐敏. 大豆脂肪和蛋白含量双高育种研究[J]. 作物学报, 1994, 20(05): 614-620
118. 李永孝; 崔如; 丁发武; 李佩璇; 王法宏; 赵经荣. 夏大豆植株氮、磷、钾含量与水肥的关系[J]. 作物学报, 1992, 18(06): 463-474
119. 郝欣先; 蒋惠兰; 李之琛; 聂翠琴; 丁发武; 李星华. 夏大豆粒茎比值的高产效应及其遗传变异的研究[J]. 作物学报, 1992, 18(05): 380-386
120. 杨光宇; 郑惠玉; 韩春凤. 栽培大豆(*G. max*)×半野生大豆(*G. gracilis*)后代主要农艺性状遗传参数的初步分析[J]. 作物学报, 1992, 18(06): 439-446
121. 刘春燕; 陈庆山; 辛大伟; 邱红梅; 单大鹏. 大豆花叶病毒侵染初期的抗病性表达序列标签分析[J]. 作物学报, 2005, 31(11): 1394-1399
122. 许守民; 鲍晓明; 苗以农; 朱长甫; 刘学军. 结瘤和非结瘤大豆同位基因系种子荚皮发育中POD和SOD活性的比较[J]. 作物学报, 1993, 19(05): 453-459
123. 马国荣; 刘佑斌; 盖钧镒. 大豆细胞质遗传芽黄突变体的发现[J]. 作物学报, 1994, 20(03): 334-338
124. 张明才; 何钟佩; 田晓莉; 段留生; 王保民; 翟志席; 董学会; 李召虎. SHK-6对干旱胁迫下大豆叶片生理功能的作用[J]. 作物学报, 2005, 31(09): 1215-1220
125. 原亚萍; 许耀奎. 平阳霉素(Pingyangmycin)对大豆诱变效应的研究[J]. 作物学报, 1993, 19(01): 7-16
126. 黄中文; 赵团结; 喻德跃; 陈受宜; 盖钧镒. 大豆抗倒伏性的评价指标及其QTL分析[J]. 作物学报, 2008, 34(04): 605-611
127. 王芳; 赵团结; 喻德跃; 陈受宜; 盖钧镒. 大豆苗期耐淹性的遗传与QTL分析[J]. 作物学报, 2008, 34(05): 748-753

128. 张军;赵团结;盖钧镒.大豆育成品种农艺性状QTL与SSR标记的关联分析[J].作物学报, 2008,34(12): 2059-2069
129. 黄中文;赵团结;喻德跃;陈受宜;盖钧镒.大豆生物量积累、收获指数及产量间的关系与QTL分析[J].作物学报, 2008,34(06): 944-951
130. 单大鹏;齐照明;邱红梅;单彩云;刘春燕;胡国华;陈庆山.大豆油分含量相关的QTL间的上位效应和QE互作效应[J].作物学报, 2008,34(06): 952-957
131. 郑洪兵;徐克章;赵洪祥;李大勇;杨光宇;刘武仁;陆静梅.吉林省大豆品种遗传改良过程中主要农艺性状的变化[J].作物学报, 2008,34(06): 1042-1050
132. 孙石;赵晋铭;武晓玲;郭娜;王源超;唐卿华;盖钧镒;邢邯.大豆品种RGA分析与疫霉根腐病抗性鉴定[J].作物学报, 2008,34(10): 1704-1711
133. 赵洪祥;徐克章;杨光宇;杨春明;边少锋;陆静梅.吉林省82年来育成大豆品种的产量和叶片部分生理特性变化及其相互关系[J].作物学报, 2008,34(07): 1259-1265
134. 文自翔;赵团结;郑永战;刘顺湖;王春娥;王芳;盖钧镒.中国栽培和野生大豆农艺及品质性状与SSR标记的关联分析 II. 优异等位变异的发掘[J].作物学报, 2008,34(08): 1339-1349
135. 张军;赵团结;盖钧镒.中国东北大豆育成品种遗传多样性和群体遗传结构分析[J].作物学报, 2008,34(09): 1529-1536
136. 樊金萍;柏锡;李勇;纪巍;王希;才华;朱延明.野生大豆S-腺苷甲硫氨酸合成酶基因的克隆及功能分析[J].作物学报, 2008,34(09): 1581-1587
137. 李文福;刘春燕;高运来;李灿东;蒋洪蔚;王堃;陈庆山;胡国华.大豆种粒斑驳抗性的遗传分析及基因定位[J].作物学报, 2008,34(09): 1544-1548
138. 董登峰;李杨瑞;江立庚.油菜素内酯对铝胁迫大豆光合特性的影响[J].作物学报, 2008,34(09): 1673-1678
139. 袁翠平;卢为国;刘章雄;李英慧;李卫东;关荣霞;常汝镇;邱丽娟.大豆抗胞囊线虫4号生理小种新品系SSR标记分析[J].作物学报, 2008,34(10): 1858-1864
140. 单大鹏;朱荣胜;陈立君;齐照明;刘春燕;胡国华;陈庆山.大豆蛋白质含量相关QTL间的上位效应和QE互作效应[J].作物学报, 2009,35(1): 41-47
141. 周蓉;王贤智;陈海峰;张晓娟;单志慧;吴学军;蔡淑平;邱德珍;周新安;吴江生.大豆倒伏性及其相关性状的QTL分析[J].作物学报, 2009,35(1): 57-65
142. 李卫东;卢为国;梁慧珍;王树峰;李金英;于兆成;耿臻;刘亚非.大豆子粒棉子糖含量与生态因子的关系[J].作物学报, 2009,35(1): 156-161
143. 洪彦彬;陈小平;刘海燕;周桂元;李少雄;温世杰;梁炫强.源于大豆EST的花生属(Arachis)同源SSR标记的开发及利用[J].作物学报, 0,(): 0-
144. 周斌;邢邯;陈受宜;盖钧镒.大豆重组自交系群体NJRIKY遗传图谱的加密及其应用效果[J].作物学报, 2010,36(1): 36-46
145. 高运来;朱荣胜;刘春燕;李文福;蒋洪蔚;李灿东;姚丙晨;胡国华;陈庆山.黑龙江部分大豆品种分子ID的构建[J].作物学报, 2009,35(2): 211-218
146. 秦君;李英慧;刘章雄;栾维江;闫哲;关荣霞;张孟臣;常汝镇;李广敏;马峙英;邱丽娟.黑龙江省大豆遗传结构及遗传多样性分析[J].作物学报, 2009,35(2): 228-238
147. 敖雪;谢甫绵;刘婧琦;张惠君.不同磷效率大豆品种光合特性的比较[J].作物学报, 2009,35(3): 522-529
148. 张久权;张凌霄;张明华;WATSON Clarence.应用神经网络和统计模型预测大豆生长发育阶段[J].作物学报, 2009,35(2): 341-347
149. 马炳田;曲广林;黄文娟;林瑜凡;李仕贵.大豆立枯丝核菌G蛋白 $\beta$ 亚基基因的克隆与分析[J].作物学报, 2009,35(2): 370-374
150. 俞慧娜;刘鹏;徐根娣;蔡妙珍.铝胁迫下大豆根尖细胞铝的微区分布与耐铝性分析[J].作物学报, 2009,35(4): 695-703
151. 张大勇;李文滨.黑龙江省大豆籽粒异黄酮含量生态差异[J].作物学报, 2009,35(4): 711-717
152. 费志宏;吴存祥;孙洪波;侯文胜;张宝石;韩天富.以光周期处理与分期播种试验综合鉴定大豆品种的光温反应[J].作物学报, 2009,35(8): 1525-1531
153. 黄方;何慧;迟英俊;盖钧镒;喻德跃.大豆GmTINY1基因的克隆与表达分析[J].作物学报, 2009,35(12): 2174-2179
154. 邱红梅;刘春燕;张代军;辛秀君;王家麟;王晶;单彩云;单大鹏;胡国华;陈庆山.大豆抗疫霉根腐病的蛋白组研究[J].作物学报, 2009,35(3): 418-423
155. 徐冉;李伟;王彩洁;张礼凤;戴海英;邢邯.大豆抗烟粉虱的鉴定体系研究[J].作物学报, 2009,35(3): 438-444
156. 杨加银;盖钧镒.黄淮地区大豆重要亲本间产量的杂种优势、配合力及其遗传基础[J].作物学报, 2009,35(4): 620-630
157. 周蓉;陈海峰;王贤智;张晓娟;单志慧;吴学军;蔡淑平;邱德珍;周新安;吴江生.大豆产量和产量构成因子及倒伏性的QTL分析[J].作物学报, 2009,35(5): 821-830
158. 程立宝;李淑艳;景新明;何光源.表达大豆GMCHI基因能够提高原核生物对耐低温性[J].作物学报, 2009,35(6): 1156-1160
159. 南海洋;李英慧;常汝镇;邱丽娟.基于大豆胞囊线虫抗病候选基因rhg1的InDel标记发掘与鉴定[J].作物学报, 2009,35(7): 1236-1243
160. 蒋洪蔚;李灿东;刘春燕;张闻博;邱鹏程;李文福;高运来;胡国华;陈庆山.大豆导入系群体芽期耐低温位点的基因型分析及QTL定位[J].作物学报, 2009,35(7): 1268-1273
161. 苗淑杰;乔云发;韩晓增\*;王树起;李海波.缺磷对已结瘤大豆生长和固氮功能的影响[J].作物学报,

- 2009,35(7): 1344-1349
162. 黄中文,赵团结, 盖钧镒.大豆不同产量水平生物量积累与分配的动态分析[J]. 作物学报, 2009,35(8): 1483-1490
163. 关荣霞,秦君,胡静深,陈为秀,常汝镇,刘章雄,邱丽娟.优良大豆品种合丰25的遗传组成[J]. 作物学报, 2009,35(9): 1590-1596
164. 冯乃杰, 郑殿峰,赵玖香, 祖伟, 杜吉到, 张玉先, 梁喜龙.植物生长物质对大豆叶片形态解剖结构及光合特性的影响[J]. 作物学报, 2009,35(9): 1691-1697
165. 齐林, 杨国敏, 周勋波, 陈雨海, 高会军, 刘岩.夏大豆群体内植株分布对干物质积累分配及产量的影响[J]. 作物学报, 2009,35(9): 1722-1728
166. 宋万坤, 朱命喜, 赵阳林, 王晶, 李文福, 刘春燕, 陈庆山, 胡国华.大豆脂肪酸合成关键酶基因的电子定位及结构分析[J]. 作物学报, 2009,35(10): 1942-1947
167. 束永俊, 李勇, 柏锡, 才华, 纪巍, 朱延明\*.基于基因重测序信息的大豆基因靶向CAPS标记开发[J]. 作物学报, 2009,35(11): 2015-2021
168. 刘顺湖,周瑞宝,盖钧镒.大豆蛋白质有关性状遗传的分离分析[J]. 作物学报, 2009,35(11): 1958-1966
169. 刘顺湖, 周瑞宝, 喻德跃, 陈受宜, 盖钧镒.大豆蛋白质有关性状的QTL定位[J]. 作物学报, 2009,35(12): 2139-2149
170. 张清哲, 马锦花, 陈新建, 傅永福.大豆 $GmCOL4$ 基因的克隆与分析[J]. 作物学报, 0,(): 0-
171. 印志同, 宋海娜, 孟凡凡, 许晓明, 喻德跃.大豆光合气体交换参数的QTL分析[J]. 作物学报, 2010,36(1): 92-100
172. 魏金鹏, 鄂文弟, 刘章雄, 关荣霞, 常汝镇, 邱丽娟.大豆[*Glycine max* (L.)]成熟期近等基因系导入片段分析[J]. 作物学报, 2010,36(2): 233-241
173. 李广军,李河南,程利国,章元明.大豆叶绿素含量动态表达的QTL分析[J]. 作物学报, 2010,36(2): 242-248
174. 王晓波,蒋凌雪,魏利,刘林,陆伟,李文欣,王俊,陶波,常汝镇,邱丽娟.外源抗草膦EPSPs基因在大豆基因组中的整合与定位[J]. 作物学报, 0,(): 0-
175. 束永俊, 李勇, 吴娜拉胡, 柏锡, 才华, 纪巍, 朱延明.大豆EST-SNP的挖掘鉴定及其CAPS标记的开发[J]. 作物学报, 0,(): 0-

文章评论 (请注意:本站实行文责自负, 请不要发表与学术无关的内容!评论内容不代表本站观点.)

HTTP Status 404 -  
</zwxb/CN/comment/listCommentInfo.jsp>

---

type Status report

---

Copyright 2008 by 作物学报