

- [首页](#)
- [单位简介](#)
 - [本院概况](#)
 - [领导班子成员](#)
 - [外室单位简介](#)
- [新闻资讯](#)
 - [院所新闻](#)
 - [图片新闻](#)
- [工作进展](#)
- [农时技术](#)
- [专题视频](#)
 - [农业技术视频](#)
 - [食品安全视频](#)
- [食品安全](#)
- [科技成果](#)
 - [自主技术成果](#)
 - [引进技术成果](#)
 - [论文发表](#)
- [专家答疑](#)

当前位置:

- [首页](#)
- [农时技术](#)

花生苗期管理技术要点

阚玉文 41 阅读 2023-06-05 发布时间

花生幼苗期的管理主要是做好查苗补苗，促根壮苗工作，做到苗齐苗壮，促进植株多开花，为后期开花结荚打下基础。

1. 查苗、补苗

在花生出苗之后，首先要检查一下幼苗的生长情况。有些地块因为种子质量差、播种质量差或者地下害虫严重，导致有缺苗断垄的情况，春花生种植时，烂种死苗的情况比较多一些。如果有大面积缺苗的地块，要进行补苗。将种子浸泡之后，直接补种。利用这种方面进行补苗，虽然省种子，省人工，但是后期一定要重点管理。

2. 花生促根

首先就是对于根腐病的防治，尤其是对于重茬的地块，这个病经常会发生，一旦发生严重的，减产幅度甚至会达到20%以上。在这一时期的主要表现是根系的主根变成黄褐色，植株矮小长不大，叶片变黄，甚至是死亡。如果根腐病发病率达到了5%时，我们就应该着手进行药剂防治，当然有条件的提前预防是最稳妥的办法。防治的方法一个是拌种，另一个就是药剂喷施。

2.1 拌种，推荐大家含使用苯醚甲环唑、咯菌腈、精甲霜灵、稀唑醇等药剂中的一种就可以。

2.2 药剂喷施，每亩使用10%苯醚甲环唑50-80克或者25%的戊唑醇25-35克，兑水100斤左右，进行喷施，间隔一周左右喷一次，连续喷施2-3次，最好是两种药剂换着使用效果最佳。

3. 花生促壮苗

3.1 花生属于豆科作物，所以它大部分的氮素来源于根瘤，而在花生苗期阶段根瘤形成的速度还比较慢，所以我们喷施含有钼肥的叶面肥就尤其重要，它会提高花生的固氮能力。一桶水用15克钼酸铵，对产量的提升还是特别明显的。硼肥能够促进花生多开花，促进其它元素的吸收。花生出苗后，再过一段时间就是开花的阶段，我们也可以结合着硼肥一起喷施，对于花生促花促果有很大的作用。

3.2 病虫害防治，虫害主要是蚜虫，如果花生地里每100棵苗出现1000头左右的蚜虫时，我们应当立即进行药剂防治。推荐大家每亩使用25克/升的氯氰菊酯20-25毫升，同样每隔一周左右喷施一次，连续使用2-3次，效果最佳。如果没有发病选择预防的话建议每亩使用25%噻虫嗪1.6-3.2克，兑水60-80斤进行喷雾。

3.3 对于花生苗弱的地块建议每亩搭配99%的磷酸二氢钾150克+0.01%的芸苔素内酯10毫升。

热门文章

- [1蔬菜防范大风降温技术指导](#)
- [2果树涝害后管理要点](#)
- [3波斯菊摘心注意事项](#)
- [4多肉植物养护方法](#)
- [5苹果果锈的发生与防治](#)

- [6设施樱桃夏季管理](#)
- [7网购的月季苗萎蔫的原因和应对办法](#)
- [8微型月季四季开花的养护办法](#)
- [9水中女神--睡莲](#)
- [10秋季弱树复壮](#)

主办单位：廊坊市农林科学院 地址：廊坊市广阳道285号农林科技大厦 电话：0316-2189909

备案序号：[冀ICP备13021151号-1](#) 公安备案：[冀公网安备 13100302000548号](#)

廊坊市农林科学院 版权所有 ©Copyright 2021 All Rights Reserved.



扫码关注廊坊农科院公众号