中药材

砂仁采收后的科学管理

来源：耕种帮种植网 发布时间：2024-03-25 12:14:17 分享

每年在7月下旬至8月上旬进行砂仁采收，采收结束后的管理工作不容忽视，搞好科学的管理是砂仁获得连年稳产高产的重要措施，现将主要管理措施述下：

割除老苗

砂仁结果后植株群体中的枯老苗，长势已经衰退，不但消耗水分、养分，而且易感染病虫害，影响群体中健株生长。因此在采果后，应立即将枯老弱株、病株割除，集中地外烧毁，每平方米只留下40～50健株，而利于砂仁地内通透光，减少养分消耗和病虫害发生，促进植株生长健壮。

调节荫蔽度

砂仁是一种喜阴植物，按其生长发育习性，只有在50％荫蔽度的条件下才能正常生长发育。荫蔽度过小或过大均不利于其生长发育。因此，在每年收果后应对砂仁地内的荫蔽度进行适当调节，荫蔽过大的应将砂仁地内荫蔽树进行修枝或砍伐，减少其荫蔽度。荫蔽过小的地块则种上速生树种以增加荫蔽度，而有利砂仁植株群体生长健壮。

施肥

经过开花结果的砂仁植株群体，消耗了大量养分，为了使其群体长势得到迅速恢复和促进秋笋长出，为第二年获得高产打下坚实基础，在收果割老苗后，每亩用厩肥、堆肥3000kg，花生30kg（或豆饼50kg），过磷酸钙25kg。将上述肥料经共同沤制腐熟后均匀撒施入砂仁地内，施后培土盖过葡萄茎1/2为度。这次施肥称促笋肥。进入第二年2月下旬至3月上旬，每亩施入人粪尿1000kg，尿素5kg进行泼施，这次称壮苗肥，而促进砂仁多长笋，苗长壮，为砂仁群体多花结果打下基础。

病虫害防治

常见病虫害有：

（1）叶枯病 多发生于秋冬季荫蔽不足地块。防治方法：调节砂仁地内荫蔽度在50％左右为宜；天气干旱时加强浇水或灌溉；发病初期用70％托布津1000倍液喷洒防治。

（2）叶斑病 冬季干旱或霜冻后易发生。防治方法：采果后清除病株病叶集中烧毁；增施磷钾肥，并适当喷水；发病初期用50％托布津可湿性粉剂800倍液喷洒防治。

（3）钻心虫 为害砂仁幼笋生长点，造成枯心。防治方法：发现被害幼笋立即割除集中烧毁，成虫产卵期用40％乐果1000倍液或90％敌百虫800倍液喷杀。

转载请注明 “来源” ：四川农村信息网

相关信息

2024年薏苡生产技术指导意见

为了充分发挥薏苡主产区的产业优势，因地制宜发展薏苡生产，推进科学栽培，提高种植效益，农业农村部小宗粮豆专家指导组会同全国农业技术推广服务中心根据当前生产形势，提出以“适时...

全国农业技术推广服务中心 2024-04-07 10:32:24

辣蓼的种植技术

辣蓼 ，中药名，为蓼科植物辣蓼的全草。 辣蓼 ，一年生草本，高60～90厘米，全株散布腺点及毛茸。茎直立，或下部伏地，通常紫红色，节膨大。叶互生，有短柄;叶片广披针形。治痢疾，便...

农百科 2024-04-03 11:14:06

贝母的施肥方法

贝母是喜肥作物，因此在生长期间需要及时施肥，尤其是新鳞茎形成期，需要满足它的养分的需求，为母鳞茎根系的发育和新鳞茎的生长创造好的生长条件，还需在栽种的时候施加基肥。

农资招商网 2024-04-02 11:20:17

杜仲种植存在的几种常见问题及解决方法

杜仲栽后生长 5～7 年即可采收，每株一年环剥一次，2～3年为一个周期；每次每株一般产干品3～5公斤，10～25年的成龄树产量可达10公斤以上。而种植中因为种植户们存在的几种常见问题，容...

耕种帮种植网 2024-04-01 11:22:50

黄连的留种方法

黄连移栽之后二年就可开花结实，这个时候可以采收种子。通常情况下，都以栽后3~4年生的黄连植株所生的种子质量为最好的，这一时期的黄连种子的数量也比较多。一般在5月的中旬，当黄连...

耕种帮种植网 2024-03-29 10:29:00

Load more

川公网安备 51010502010980号
主办单位：四川省人民政府
承办单位：四川省气象局
版权所有：四川省农村经济综合信息中心
蜀ICP备11018099号-1
业务咨询电话：028-87360982
E-mail: 2235499875@qq.com
地址：四川省成都市青羊区光华村街20号（四川省气象局塔楼）