

欢迎访问廊坊市农林科学院官网!

全部

输入内容搜索...

搜索

- [首页](#)
- [单位简介](#)
  - [本院概况](#)
  - [领导班子成员](#)
  - [处室单位简介](#)
- [新闻资讯](#)
  - [院所新闻](#)
  - [图片新闻](#)
- [工作进展](#)
- [农时技术](#)
- [专题视频](#)
  - [农业技术视频](#)
  - [食品安全视频](#)
- [食品安全](#)
- [科技成果](#)
  - [自主技术成果](#)
  - [引进技术成果](#)
  - [论文发表](#)
- [专家答疑](#)

当前位置:

- [首页](#)
- [农时技术](#)

## 梨树早丰密植园建园技术

王俊山 56 阅读 2023-06-30 发布时间

### 一、嫁接

梨树最好在7月中旬至8月上旬,采用“T”字形芽接。嫁接后10~15 d检查成活情况,已经成活,可除掉绑缚物,未活的应及时补接。此时如树不离皮可改为带木质芽接。翌年发芽前,在接芽上方1cm处将砧木剪掉,其剪口呈马蹄形,其芽接方高,对面低。随时除掉砧木的萌蘖枝。春天剪砧后应及时追肥、浇水,苗高30 cm左右时,再一次追肥和浇水,每次施尿素5 kg,到9月要控制水肥,以便促进嫁接苗木木质化。

### 二、建园及幼树管理

1.梨园的选择 沙地、山地、丘陵和轻盐碱地均可栽植。

2.整地 常规法整地,要求地平勿积水。按株距2m,行距2m×2m×2m×2m×4m,穴0.8m×0.8m×0.8m。其中一行宽为4m,是为方便打药、叶面喷肥等作业。

3.定植 3月底至4月初定植,穴施腐熟有机肥20~30kg,先把肥和土混合均匀填入坑中,随填随踏实,直至距地面30cm时把中间修成馒头形。然后将梨苗放在“馒头”顶部,使根系向四周自然伸展,紧接回填土,同时摇苗向上轻提使根舒展,踏实,周围筑埂、浇足水。

4.定干 定干高度以50~70cm为宜,剪口下留饱满芽10个左右,以便选择主枝,在主干不同方位,选择错落排列的4~5个芽定为主枝。

5.纺锤形整形 主干高度50~70cm,有一个优势强壮的中心干,从主干往上螺旋上升,间隔30cm左右,插空着生8~10个大分枝(大枝组),无明显层次,均匀地伸向四面八方,错落着生。枝组与主干角度65~70°。在大分枝上直接着生小结果枝组,不养大侧枝。通过人工拉枝甩放、或疏、或缩,少用短截,逐步构成有干有轴有组,无主无侧无层的纺锤冠形。

6.盛果期的管理 为了使果实品质达上等、大小匀称,每年需要疏一次果,其原则是使果间距25~30cm,过密者疏掉。每年施肥4次:萌芽肥(5月中、下旬);果实膨大肥2次(7月上、中旬和8月上、中旬);基肥(采收后至落叶前)。前3次以无机肥为主,第4次以有机肥为主。春天解冻后发芽前浇水1次,其余均结合每次施肥浇水。

## 热门文章

- [1 蔬菜防范大风降温技术指导](#)
- [2 果树涝害后管理要点](#)
- [3 波斯菊摘心注意事项](#)
- [4 多肉植物养护方法](#)
- [5 苹果果锈的发生与防治](#)
- [6 设施樱桃夏季管理](#)
- [7 网购的月季苗萎蔫的原因和应对办法](#)
- [8 微型月季四季开花的养护办法](#)
- [9 水中女神--睡莲](#)

- 10秋季弱树复壮

主办单位：廊坊市农林科学院 地址：廊坊市广阳道285号农林科技大厦 电话：0316-2189909

备案序号：[冀ICP备13021151号-1](#) 公安备案：[冀公网安备 13100302000548号](#)

廊坊市农林科学院 版权所有 ©Copyright 2021 All Rights Reserved.



扫码关注廊坊农科院公众号