

瓜果

百香果烂根要怎么补救?

来源: 惠农网

发布时间: 2024-02-04 10:27:27

分享

百香果是市场上很常见的一种水果,其含有多种水果的浓郁香味,是世界上已知最芳香的水果之一,有“果汁之王”之美称。由于种植前景较好,目前已在我国海南、福建、广东、广西等地广泛种植。但在百香果的种植过程中,经常会出现烂根问题,那么要怎么补救好?

百香果烂根的原因

1、排水不好

百香果为浅根系作物,怕涝。因此果园排水工作没做到位的话,就很容易造成果树烂根。



2、施肥不当

施肥过量会引起烧根,长期使用化肥会引起土壤酸化或板结,造成土壤通透性差,还会减少土壤中的有益菌,增加烂根的可能性。

3、土壤问题

土壤严重酸化、板结,通气性不良等,都易导致出现烂根现象,影响根系健壮生长。

4、病害影响

根腐病或茎基腐病等病害导致的烂根。

百香果烂根怎么补救?

1、土壤选择

在土壤疏松,土壤肥沃,排水良好的地方建园,适合百香果的生长。土壤pH值为7.5左右为宜。

2、中耕培土

尽量减少使用除草剂,及时通过中耕除草,保持土层疏松,透气性良好。

3、及时排水

日常要及时做好田间水分疏通排除工作,雨季更应采取排水措施,修建排水沟等。

4、施肥要点

合理施肥,要根据植株的长势来施肥,切勿施肥过量、浓度过高。种植期间,除施足基肥外,还可通过叶面喷施多肽酵素、多元素等叶面肥来提高植株抗病能力。

5、病害防治

百香果根腐病可田间冲施或滴灌微生物菌肥根小子稀释300-500倍液,来抑制病菌的蔓延;百香果茎基腐病可以使用盈盾(精甲·咯·密菌)、枯草芽孢杆菌、敌克松、哈茨木霉菌等农,全园淋根杀菌,根部要畅开,保持干燥,三至四次,隔七天左右一次。

转载请注明“来源”:四川农村信息网



相关信息



桃树谢花后如何施肥?

桃树谢花后的管理是重中之重,如果此时桃树生理落果多,幼果小,转青慢,畸形果,流胶病等等,都直接关系到果实的品质和当年的产量。谢花后是幼果快速发育期,那么如何做好桃树谢花后...

农业科技报

2024-04-07 10:14:46



猕猴桃授粉技术要点

最佳时间。给猕猴桃授粉的最佳时间是猕猴桃从现蕾到开花,这段时间大概是35-40天左右,1朵花需要开放2-4天左右,盛花期是3-4天左右。

农业科技报

2024-04-03 10:01:56



2024年苹果春季科学施肥指导意见

环渤海湾苹果产区增施有机肥,提倡有机无机配合;依据土壤测试结果适当调减氮磷钾肥用量,增加钙、镁、硼和锌等中微量元素肥料用量。

全国农技推广网

2024-04-02 10:22:09



2024年梨、桃、荔枝、葡萄春季科学施肥指导意见

梨:增施有机肥料,实施梨园生草、覆草,培肥土壤;土壤酸化严重的果园施用石灰和有机肥进行改良;盐渍化严重的果园采用排灌措施、增施有机肥、施用石膏、覆盖地膜或有机物料进行改良。

全国农技推广网

2024-04-01 10:00:15



关于加强春季低温条件下猕猴桃田间管理的建议

猕猴桃产业是我省重要的优势特色产业。春季是猕猴桃生长发育及病害防治的关键时期,低温会严重影响猕猴桃正常生长,造成溃疡病的发生流行。春季低温来临时,各产区需及时开展全园灌水、...

四川农科院

2024-03-29 10:00:12

Load more

