


【作者】	吴代东, 吴宗立, 韦绍龙, 李朝生, 韦华芳
【单位】	广西壮族自治区农业科学院生物技术研究所, 广西南宁
【卷号】	36
【发表年份】	2008
【发表刊期】	29
【发表页码】	12663-12665
【关键字】	罗汉果; 2茬栽培; 栽培技术
【摘要】	<p>[目的] 研究罗汉果组培苗2茬栽培关键技术。[方法] 以“青冠”组培苗为材料, 第1茬为杯苗栽培, 第2茬为宿根留蔓栽培, 采用棚面宿根留蔓和棚下宿根留蔓2种留蔓方式。测定小区产量, 调查病虫害及物候期, 计算投入产出。[结果] 第2茬采用棚面宿根留蔓栽培的萌芽期比棚下宿根留蔓栽培的推迟7 d, 但前者现蕾期和开花期分别提早5和3 d。第2茬栽培的现蕾期、开花期和成熟期分别比第1茬栽培提前了65、62和40 d。与第1茬栽培相比, 第2茬栽培大、中果实比率有较大提高, 小果率降低, 结果株率为100%, 果实等级和产量显著提高。[结论] 棚面宿根留蔓栽培和棚下宿根留蔓第2茬栽培净收益分别为126 139.5和117 994.5元/hm², 分别比第1茬栽培净收益增加了175.1%和150.9%。</p>
【附件】	 PDF下载 PDF阅读器下载

关闭