

【作者】 包东娥, 刘遵春, 宋林森

【单位】 河南科技学院, 河南新乡

【卷号】 34

【发表年份】 2006

【发表期刊】 18

【发表页码】 4515 , 4526

【关键字】 金太阳杏; 果实生长发育; 数学模型

在果实生长发育期, 通过测定金太阳杏果实纵、横、侧径、体积、鲜重及干重, 建立起金太阳杏果实生长模型。金太阳杏果实纵、横、侧径、鲜重与体积生长曲线呈“双S”型, 生长模型曲线分别为:  $y = -2.7119 + 0.3528x - 0.007x^2 + 5 \times 10^{-5}x^3$ ,  $R^2 = 0.989$ ;  $y = -2.7518 + 0.3033x - 0.0052x^2 + 3.4 \times 10^{-5}x^3$ ,  $R^2 = 0.990$ ;  $y = -2.5068 + 0.2767x - 0.0048x^2 + 3.2 \times 10^{-6}x^3$ ,  $R^2 = 0.988$ ;  $y = -22.756 + 1.9784x - 0.351x^2 + 0.0003x^3$ ,  $R^2 = 0.991$ ;  $y = -15.344 + 1.1932x - 0.01x^2 + 8.8 \times 10^{-5}x^3$ ,  $R^2 = 0.994$ 。果实干重生长曲线呈“单S”型, 生长模型曲线为  $y = 1/(1/7 + 56.1212 \times 0.8805x)$ ,  $R^2 = 0.995$ 。

【附件】



[PDF下载](#)



[PDF阅读器下载](#)

[关闭](#)