



## 白肉紫圆茄露地专用品种“宝来三号”露地一大茬栽培技术

2020-03-12

“宝来三号”茄子新品种，晚熟白肉紫圆茄，天津科润蔬菜所选育而成，已新品种权保护（申请号：20172326.0）。长势旺盛，9-10片叶左右着生门茄，果形周正，连续坐果性强，产量极高。露地栽培5月初到6月中旬均可定植，9月底至10月上旬采收结束，是堵七八月份蔬菜淡季的佳品。下面介绍5月初定值的露地一大茬栽培技术。

1、育苗：3月初播种育苗，苗龄55-60天。育苗初期外界温度较低，应在温室内进行，有条件铺设地热线更能保证出苗快速整齐。一般选用32穴穴盘和茄果类专用基质，农户也可根据种植条件利用现有原料自己配制营养丰富的育苗基质，播种前浇透水。干籽直播，播种后覆盖苗床保湿，7天左右幼芽开始拱出土面，迅速撤掉覆盖物，防止高温伤害。待第一片真叶充分展开后适当大水浇苗，同时进行防猝倒、防虫等药剂处理，两到三片真叶后视幼苗长势施肥。随着外界温度的升高，为防止幼苗徒长，应加大苗棚通风。定植前一周，夜间不关风口，或移至阳畦进行炼苗。

苗期适宜温度白天25-30℃，夜间不低于12℃。掌握见干见湿的浇水原则。

2、定植前准备：选择地势开阔、排水良好、土质肥沃的地块。深翻土壤30-40厘米，施足底肥。高垄双行栽培，垄宽70厘米，沟宽80厘米，行距50-70厘米。5月初定植，提前3-4天扣地膜。

3、定植要点：露地一大茬栽培定植密度800-1000株/亩，5月初选择晴朗无风的上午定植，定植水浇透，二点前浇完，保证膜下土壤夜温，利于缓苗。

4、肥水管理：“宝来三号”秧体旺盛，门茄膨大前不宜过度大水大肥，以防植株徒长，影响坐果。门茄膨大后开始追肥，采收期大水大肥，以保证长季节采收植株长势和持续坐果。7、8月高温天气每周增施一次叶面肥，叶面肥以磷钾肥为主。水肥正常情况下，“宝来三号”果形饱满周正，皮色光泽持续时间长。缺水缺肥时果实膨大慢且小，商品大小时已皮色暗淡，植株长势渐弱，新叶不展。浇水施肥频次视实际情况，盛果期可采收一次跟一次水肥。

5、植株调整：门茄膨大后，打掉门茄下两片叶以后的发黄叶片和枝杈。整枝方式根据密度，一般四杆整枝，四杆以外侧枝坐果后留2-3片叶摘心，依次往上连续坐果。斗茄坐果后及时打掉内堂叶片，利于通风透光和果实着色。一大茬栽培生长时间较长，植株高度逐渐增加，为防止倒伏，一般门茄采收后开始搭架。搭人字花架固定植株或吊绳，茄子连续采收、同时坐果，需要架材足够支撑。生产上多采用两边粗木桩、中间横梁的人字高架，植株吊绳，确保无限生长不到伏。

6、越夏管理要点：盛夏季节高温多雨，应做好雨后排水防涝，增加追肥，保证秧体健壮。同时，通过植株调整合理保留叶片遮荫，防止果实日灼。“宝来三号”生长势较强，管理得当能够安全越夏，丰富7、8月淡季蔬菜供应。

7、病虫害防治：以防为主，早发现早防治。

虫害：露地高温季节虫害防治应在清晨温度升高前打药，几种药剂交替使用，连续用药。蓟马、蚜虫、啮黄蚜等喜食花器幼嫩部位，会导致果面尤其是果脐部粗糙，影响果实商品性，因此需要花期前即开始防治。

病害：不使用嫁接苗的地区种植过程中土传病害较为严重，且枯萎病、黄萎病、根腐病常混合发生。重茬和根系不发达是主要原因。采用嫁接苗为最有效防治土传病害的方法，其次是提前施用敌克松、福美双、恶霉灵等进行

药剂防治，及时排水减轻沤根。7、8月份降雨频繁，雨后高温高湿亦容易发生果实绵疫及叶部病害，因此每次雨后应及时喷施百菌清、恶霉灵等杀菌剂进行药剂防治。

露地栽培也常发生畸形果、裂果、果实皮色暗淡等生理性病害。

大果脐、果面棱沟的现象多发生于门茄或对茄以下，主要因为苗期和定植过早遇到低温，随着温度的升高，上部果实会逐渐好转。温度过高时也容易导致花器形成不正常，果实畸形不能正常膨大，或植株营养吸收障碍，因而皮色暗淡失去光泽，此时应加强水肥管理。后期裂果主要因为昼夜温差逐渐加大、突然大水导致的营养不均衡，因此在氮磷钾均衡施肥的同时，后期宜小水勤浇。

---

上一篇：[天津地区早春油菜保护地栽培关键技术](#)

下一篇：[春季西瓜苗期温度管理](#)



版权所有 © 天津科润蔬菜研究所 津ICP备11004122号  
客服电话:4000-4567-55 E-mail:kaifabu@tjscs.cn

技术支持：[云梦网络](#) 