



当前位置: 品种介绍

花椰菜品种介绍

时间: 2023-02-08 文章来源: 天津市农业科学院 浏览量: 5 栏目: 品种介绍 字体: 减小 增大

一、紧实型花椰菜



紧花菜春季栽培品种JX-4

品种主要性状: 春季栽培品种, 定植后55天左右成熟, 植株健壮, 深绿色叶色, 叶片椭圆、直立上冲, 花球高圆、周正、洁白、紧实, 平整, 平均单球重1.86kg。

种植季节: 春季栽培。春季栽培掌握好播期防止提前抽薹。露地栽培, 华北地区2月初温室育苗, 苗龄50天左右, 3月中下旬定植。

主要栽培措施: 花椰菜对播种期要求严格, 请根据当地气候情况慎重选择播种期, 适时播种。露地栽培, 华北地区2月份初温室育苗, 育苗注意保温, 苗龄50天左右, 培育壮苗, 切记形成小老苗。3月中下旬定植, 每亩2300株左右; 各生育期以促为主, 注意浇水施肥, 以确保优质高产。本品种亦可在试种的基础上进行保护地栽培。



紧花菜秋季栽培品种JA-1

品种主要性状: 秋季栽培品种, 定植后75天左右成熟, 植株长势中等, 株型直立上冲, 适合密植, 叶色墨绿色, 花球紧实、周正、洁白、无毛、平均单球重1.7公斤。

种植季节: 全国大部分地区秋季栽培。华北平原地区播种期在6月中旬至7月上旬。

主要栽培措施: 育苗时选择排水良好的土地做苗床, 苗期做好防治病虫害管理, 秋季苗龄25天左右, 3-4片真叶时, 及时定植, 株行距50×50厘米左右。整个生育期及时浇水施肥, 并施足底肥。



紧花菜秋季栽培品种JA-53

品种主要性状: 秋季栽培品种, 定植后70天左右成熟, 植株长势极健壮, 株型半开张, 外叶非常宽大, 花球紧实、高圆、平整、洁白, 平均单球重2.04公斤。

种植季节: 全国大部分地区秋季栽培。华北平原地区播种期在6月中旬至7月上旬。

主要栽培措施: 育苗时选择排水良好的土地做苗床, 苗期做好防治病虫害管理, 秋季苗龄25天左右, 3-4片真叶时, 及时定植, 株行距50×50厘米左右。整个生育期及时浇水施肥, 并施足底肥。

二、松散型花椰菜



S-45

品种主要性状: 本所新育成的雄性不育系杂种一代青梗松花菜秋季早熟品种, 秋季定植后45天左右采收。耐热耐湿, 抗病性强, 适应性广; 植株直立, 紧凑, 适合密植; 花球扁半球型, 洁白、细嫩、光滑, 青梗, 品质好, 商品性好, 单球重可达1.0公斤左右, 亩产可达3000公斤以上。

种植季节: 秋季栽培。华北平原在6月15日至30日左右播种, 浙、闽沿海平原地区在7月20日至8月20日播种。

主要栽培措施: 育苗时选择排水良好的土地做苗床, 苗期做好防治病虫害管理, 秋季苗龄25天左右, 3-4片真叶, 及时定植, 株行距50×60厘米左右。整个生育期及时浇水施肥, 并施足底肥。



津松66A

品种主要性状: 本所新育成的雄性不育系杂种一代青梗松花菜秋中熟品种, 秋季定植后70天左右采收。耐热耐湿, 抗病性强, 适应性广; 植株直立, 较紧凑, 花球呈半球型, 花球洁白、细嫩、光滑、口感酥脆, 品质好, 商品性好, 单球重可达1.2公斤左右, 亩产可达3500公斤以上。

种植季节: 秋季栽培。华北平原在6月20日至7月10日左右播种, 浙、闽沿海平原地区在7月25日至8月25日播种。

主要栽培措施: 育苗时选择排水良好的土地做苗床, 苗期做好防治病虫害管理, 秋季苗龄25天左右, 3-4片真叶, 及时定植, 株行距50×60厘米左右。整个生育期及时浇水施肥, 并施足底肥。



QA-5

品种主要性状: 中熟松花品种, 秋季定植后75天左右采收, 春季定植后50天左右采收; 植株生长旺盛, 抗性好, 耐湿、耐热, 易于栽培, 花球松大, 球面洁白细嫩, 单球重达1.5公斤以上, 肉质柔软, 商品性好, 是目前市场所需求的高品质中熟品种。

种植季节: 大部分地区秋季栽培及部分地区春季栽培。华北平原在6月15日至7月10日左右播种, 春露地在2月10日至3月1日左右播种, 浙、闽沿海平原地区在8月15日至10月1日左右播种。

主要栽培措施: 育苗时选择排水良好的土地做苗床, 苗期做好防治病虫害管理, 秋季苗龄25天左右, 3-4片真叶, 及时定植, 株行距55×60厘米左右。整个生育期及时浇水施肥, 并施足底肥。



QA-86

品种主要性状: 本所最新育成的不育系青梗松花菜杂种一代, 属中晚熟类型, 株型半开张, 心内叶护球, 耐寒耐湿, 抗病性强, 适应性广; 秋季定植后85天左右采收, 春季定植后60天左右采收; 花球松大, 洁白, 青梗, 单球重2.0公斤左右, 品质极优, 口感甜脆, 产量高。

种植季节: 秋季栽培及春季栽培。华北平原在6月20日至7月10日左右播种, 春露地在2月1日至3月1日播种, 浙闽沿海平原在9月1日至12月1日播种。

主要栽培措施: 育苗时选择排水良好的土地做苗床, 苗期做好防治病虫害管理, 秋季苗龄25天左右, 3-4片真叶, 及时定植, 株行距55×60厘米左右。整个生育期及时浇水施肥, 并施足底肥。

三、西兰花新品种

暂无提供

国家农业部

国家科技部

市农业农村委

市科技局

各省农科院

重点农业高校

学会机构



主办单位: 天津市农业科学院 版权所有: 天津市农业科学院
津ICP备20005166号-1 津公网安备 12010402001731号
地址: 天津市南开区白堤路268号 邮编: 300192 电话: 022-23678666

联系我们
微信公众号
抖音平台

