

[首页](#)[政务公开](#)[政务服务](#)[政民互动](#)[要闻动态](#)[京彩三农](#)[数据发布](#)[首页](#) > [京彩三农](#) > [现代农业故事](#) > [三农科普](#)

节气探农事 | 小寒节气与蔬菜生产

来源：京彩三农公众号 发布时间：2024年01月09日 【字体：大 中 小】

分享：

二十四节气是我国劳动人民在长期生产实践中总结出的农业与气象相结合的精髓，是我国传统农耕文化的瑰宝。节气与农业生产密切相关，每个节气因不同地区而产生的温度、湿度、光照等也各有特点。

小寒是农历的第23个节气，在今年公历的1月6日，太阳达到黄经285°，开始进入小寒节气，标志着开始进入一年中最寒冷的日子。在蔬菜生产中，正值春茬蔬菜育苗及越冬茬蔬菜管理的关键时期，期间重点工作包括以下几个方面。

加强设施管理

- 通过多种措施提升和改善棚室温光性能，为作物生长创造良好的温光环境，确保作物安全；
- 加强结构维护和积雪清理确保设施安全；
- 重点从人身安全和消防安全两个方面做好安全生产。

早春茬蔬菜作物育苗

播种育苗

- 根据定植期和日历苗龄倒推确定播种期；
- 对于非种衣剂包衣种子要采用温汤浸种或药剂浸种等方式进行种子消毒；
- 根据作物种类和生理苗龄要求选择适宜规格的育苗容器；
- 做好出苗期和籽苗期温度管理，促进苗齐苗壮；

具体细节可参考前期技术意见。

幼苗管理

前期播种的幼苗正处在生长期，是管理的重要时期，首先要做好保温和使其多见光，在连阴天开启补光灯，每天补光12小时左右；还要注意夜温不能过低，最低也要保证在13℃以上，否则长期的低温将影响花芽分化，形成畸形果，直接影响以后果实的品质和产量。

日光温室秋冬茬作物采收和拉秧

秋冬茬番茄、黄瓜、辣椒、西葫芦、茄子等喜温作物已进入生长后期，根据植株长势和温室内温度情况来决定是否拉秧，若室内夜间最低温度能在13℃以上，植株生长健壮就尽量推迟拉秧。若达不到以上条件应适时拉秧，并抓紧腾茬整地，准备播种或定植耐寒性好的油菜、生菜等快熟蔬菜（前期技术意见已述及）。

越冬茬喜温蔬菜的田间管理

日光温室越冬茬喜温蔬菜正值管理关键期，除了按前期技术意见做好设施管理、温光调控、植株调整、水肥管理及病虫害防控外，要加强中耕松土，即将大行间地膜向两侧掀开后，用铁锹深挖行间过道并整碎整平后再回扣地膜，以改善根际环境。

除此之外，还要做好贮存菜的检查和管理。

[关于我们](#) [站点地图](#)
[建议意见](#) [法律声明](#)

咨询投诉：010-12316



微信



微博