

【作者】	胡新颖, 雷家军, 杨永刚
【单位】	沈阳农业大学园艺学院, 辽宁沈阳
【卷号】	34
【发表年份】	2006
【发表刊期】	18
【发表页码】	4568 - 4570
【关键字】	郁金香; 引种; 栽培
【摘要】	<p>从荷兰引进4个郁金香品种, 调查并比较了各品种的植物学特性、物候期、生长发育规律和种球繁殖特性。结果表明: 品种Large Copper 的种球最矮, 茎上柔毛最长; 品种Toronto 的种球膜质鳞片为桔红色, 无光泽, 叶片上有红褐色条纹, 种球最高、最重, 内外轮花瓣长最长, 花径、花高、雌蕊高、花药长和花丝长均最大, 但内、外轮花瓣最窄; 品种Pink Impression 植株最高, 叶片长而宽。供试4个品种郁金香均在4月上旬萌芽, 1周后展叶, 4月末现蕾, 5月上旬开花。花期一般为10 d, 品种Toronto 的花期最短, 仅为1周; 品种Apricot Beauty 花期最长, 可达2周。4个品种在现蕾前后到盛花期生长迅速。品种Apricot Beauty 的种球繁殖系数最高, 达4.91。品种Pink Impression 的一级子球产量较高, 为31.1%。</p>
【附件】	 PDF下载 PDF阅读器下载

关闭