

欢迎访问廊坊市农林科学院官网!

全部

输入内容搜索...

搜索

- [首页](#)
- [单位简介](#)
 - [本院概况](#)
 - [领导班子成员](#)
 - [处室单位简介](#)
- [新闻资讯](#)
 - [院所新闻](#)
 - [图片新闻](#)
- [工作进展](#)
- [农时技术](#)
- [专题视频](#)
 - [农业技术视频](#)
 - [食品安全视频](#)
- [食品安全](#)
- [科技成果](#)
 - [自主技术成果](#)
 - [引进技术成果](#)
 - [论文发表](#)
- [专家答疑](#)

当前位置:

- [首页](#)
- [农时技术](#)

夏季露地茄子常见的病虫害

崔绍玉 93 阅读 2023-06-30 发布时间

露地茄子常见的病虫害主要有灰霉病、红蜘蛛、茶黄螨、绵疫病、黄萎病、病毒病等

- 1、灰霉病：用腐霉利、啞菌环胺等药物防治。
- 2、红蜘蛛、茶黄螨：用克螨特、阿维菌素、达螨灵等药剂防治。
- 3、绵疫病：危害果、茎、叶、花器等部位。果实发病，病斑圆形、凹陷，变黑褐色腐烂。茎部受害、水浸状、缢缩，上部枝叶萎焉。叶面受害，形成水浸状褐色病斑，有较明显轮纹。可用醚菌酯或霜脲锰锌防治。
- 4、黄萎病：也称“半边疯”，坐果后开始表现症状，自下而上或从一边向全株发展。初期是叶脉间发黄，逐渐变褐，边缘枯死或全叶枯黄；植株病叶由下向上发展，初期中午萎焉，早晚尚可恢复，后期叶片脱落，全株死亡。发病初期及时用50%多菌灵或50%甲基托布津可湿性粉剂500倍液灌根防治。
- 5、病毒病：用植病毒灵乳剂或病毒A可湿性粉剂防治。

以上药隔7天喷施1次，连续2~3次，浓度均按说明使用。

热门文章

- [1蔬菜防范大风降温技术指导](#)
- [2果树涝害后管理要点](#)
- [3波斯菊摘心注意事项](#)
- [4多肉植物养护方法](#)
- [5苹果果锈的发生与防治](#)
- [6设施樱桃夏季管理](#)
- [7网购的月季苗萎焉的原因和应对办法](#)
- [8微型月季四季开花的养护办法](#)
- [9水中女神--睡莲](#)
- [10秋季弱树复壮](#)

主办单位：廊坊市农林科学院 地址：廊坊市广阳道285号农林科技大厦 电话：0316-2189909

备案序号：[冀ICP备13021151号-1](#) 公安备案：[冀公网安备 13100302000548号](#)

廊坊市农林科学院 版权所有 ©Copyright 2021 All Rights Reserved.



扫码关注廊坊农科院公众号