



当前位置： 首页 > 新闻动态 > 实用技术

请输入关键字

搜索

豆角发生根腐病防治有要求

作者：

日期：2022-08-11 10:25

来源：中国植保网

字号：[小 中 大]

背景：

阅读：2441

豆角根腐病主要危害根部和茎基部，发生遍及，发病严重，发病率一般在25%-40%，严重的高达60%。该病从一出苗即可发生，3-4周内进入发病高峰。及时防治应做到以下几点：

- 1、与白菜或葱蒜类蔬菜实行3年以上轮作，并平整土地，防止积水，雨后及时排水。采取高畦深沟栽培和高垄栽培，促进根系发育，增强抗病能力。
- 2、选择地势较高、疏水性较好的地块，深沟高畦整地，并适量施用石灰，防止漫灌，雨后及时排水。
- 3、及时拔除、烧毁病残株，保护植株树体。应及时喷施新高脂膜，可抑制病毒感染。堆肥、厩肥要发酵、熟透。
- 4、可用根施通配合护树大将军进行灌根，能诱导病毒集结，供护树将军靶向消毒，抑制果树根部病毒传导式感染及叶片和果实，保养植株输导系统健康工作。

保存 复制 打印

发布员：刘钊宏 审核员：梁贻玲

