

蔬菜

春季洋葱紫斑病的综合防治措施

来源：农业科技报

发布时间：2024-04-03 09:51:48

分享

症状

紫斑病主要危害洋葱、大葱，也侵染危害大蒜、韭菜。春季洋葱紫斑病主要危害叶片、花梗、鳞茎。病斑首先从叶尖开始发生，或在割马危害的伤口处形成，初期病斑小，灰色至淡褐色，中央微紫色，有黑灰色的霉状物。



病斑很快扩大为椭圆形或纺锤形，凹陷、呈暗紫色，形成同心轮纹，周围有黄色晕圈。湿度大时，病斑扩大到全叶，常使葱叶由下向上变黄枯死或折断，严重影响鲜葱的产量、品质。

防治方法

- 1.清洁田园、清除病残体等传染源。
- 2.加强管理，多施基肥、追肥，使洋葱生长健壮，增强抗病力。发病后要控制灌水，以降低土壤湿度，及早防治蓟马，以免造成伤口。
- 3.药剂防治。种子用40%甲醛300倍液浸种3小时，浸后及时洗净。发病初期喷75%百菌清可湿性粉剂600倍液、64%杀毒矾可湿性粉剂500倍液、80%绿亨代森锰锌500倍液、40%大富丹500倍液、50%扑海因1500倍液、2%多抗霉素30ppm、50%速克灵30-50克、葱蒜病菌净等药剂喷雾。以上药剂任选一种即可，各种药剂应交替使用，每7-10天喷一次，连续防治3次。在每10公斤药液中加入5-10克中性洗衣粉，可增加药液的粘着性。

转载请注明“来源”：四川农村信息网



相关信息



杏鲍菇种植常见问题及解决方法

杏鲍菇种植过程中出现畸形菇，这是比较常见的问题之一，畸形杏鲍菇会影响杏鲍菇外观，从而降低或导致杏鲍菇没有商品价值。

农业之友

2024-04-10 09:57:21



夏季韭菜种植管理技巧

夏季温度高、雨水多，韭菜生长时间长，在韭菜种植过程中需要进行严格的管理，才能提高夏季韭菜产量。

农业之友

2024-04-09 10:17:13



春笋的种植管理技术

春笋是多年生常绿的草本植物，一般采收之后，剥掉皮，然后食用它的初生、嫩肥、短壮的芽。竹笋的品种繁多，一年四季都有出产，但春笋特别鲜嫩味美，因而被誉为春天的“菜王”。

农业种植网

2024-04-08 10:02:53



2024年豌豆生产技术指导意见

豌豆是我国重要粮食作物之一，也是农业生产中理想的间套轮作作物。随着产业市场需求变化，豌豆生产种植形式及产品用途愈发呈现多元化良性发展。为因地制宜发展豌豆生产，实现产量质量效...

全国农技推广网

2024-04-07 10:02:32



春季洋葱紫斑病的综合防治措施

紫斑病主要危害洋葱、大葱，也侵染危害大蒜、韭菜。春季洋葱紫斑病主要危害叶片、花梗、鳞茎。病斑首先从叶尖开始发生，或在割马危害的伤口处形成，初期病斑小，灰色至淡褐色，中央微紫色...

农业科技报

2024-04-03 09:51:48

Load more

