

【作者】	杨晓梅, 顿珠多吉, 孔令
【单位】	西藏农牧学院动物科学技术学院, 西藏林芝
【卷号】	36
【发表年份】	2008
【发表刊期】	13
【发表页码】	5500 - 5501
【关键字】	黄瓜白粉病; 水柏枝; 草红花
【摘要】	<p>[目的] 探讨藏药材对黄瓜白粉病的防治效果。[方法] 以农药DDV 为对照, 研究水柏枝( <i>Myricaria laxiflora</i>) 和草红花( <i>Flos carthami</i>) 的乙醇、水提取液及其与DDV 混合使用对黄瓜白粉病的预防与治疗效果。</p> <p>[结果] 水柏枝的乙醇、水提取液分别比草红花的乙醇、水提取液的预防和治疗效果好。喷药3、6 d 后, 各处理的预防效果比治疗效果好得多; 喷药9 d 后, 各处理的预防和治疗效果相差不大。水柏枝乙醇提取液及其与DDV 混合使用对黄瓜白粉病的预防效果优于对照。水柏枝的乙醇、水提取液对黄瓜白粉病的防治效果在施药6 d 后最好, 施药9 d 后的治疗和预防的效果均明显下降。[结论] 水柏枝乙醇提取液和DDV 混合使用对黄瓜白粉病的防治效果最佳。</p>
【附件】	 PDF下载 <a href="#">PDF阅读器下载</a>

关闭