

研究论文

玉米抗大斑病遗传及其育种的研究

苏书文, 梅振邦, 高合明, 郭新林

山西农科院作物遗传所

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 用多基因抗大斑病自交系进行抗性遗传研究指出, 双亲病级平均值, 和 F_1 病级呈高度显著正相关($r=0.925$), 与 F_2 出现高抗株率(%)为极显著负相关($r=-0.914$); F_1 病级和 F_2 高抗株率亦呈极显著负相关($r=-0.766$)。单显性基因(Ht_1)自交系, 在不同的遗传背景中, 对 F_1 传递的显性抗病程度有不同, 在和水平抗性系杂交的 F_2 代中, 褶绿斑型植株的抗性在0~2级间发生分离。抗病育种主要是对抗性指标、选用亲本依据及组配方式几方面进行了研究。

关键词

分类号

STUDY ON THE INHERITANCE OF CORN RESISTANCE TO HELMINTHOSPORIUM TURCICUM AND ITS BREEDING

Su Shuwen, Mei Zhenbang, Gao Heming, Guo Xinling

Institute of Crop Genetics; Shanxi Academy of Agricultural Sciences

Abstract These studies were carried out in 1979—1980, in Taiyuan, Shanxi province. The results are summarized as follows: Multigenic resistance to *Helminthosporium turcicum* of most corn inbred lines in hybrid F_1 is partially dominant and a few mediate types express transgressive inheritance. Due to difference of the additive genetic effect in hybrid F_2 , rates of resistance in highly resistant plants segregated are not equal. Even if inbred lines of the same degree of resistance are crossed with the common parent, the rates of ...

Key words

DOI:

通讯作者

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(550KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

参考文献

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [复制索引](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 无 相关文章](#)
- ▶ [本文作者相关文章](#)

- [苏书文](#)
- [梅振邦](#)
- [高合明](#)
- [郭新林](#)