



瓜果

冬季桃园防病虫莫手软

来源：农业科技报

发布时间：2024-01-10 15:13:06

分享

穿孔病的防治：在桃园萌芽前喷施1次3-5波美度的石硫合剂或1:1:100波尔多液。但在生长季节忌喷波尔多液，以免发生药害。发病初期，喷65%代森锌粉剂500倍液1-2次，防治效果较好。硫酸锌石灰液对防治细菌性穿孔病有良好效果，其配方为硫酸锌0.5公斤、消石灰2公斤、水170公斤。



炭疽病的防治：在桃园萌芽前喷施3-5波美度的石硫合剂1次；萌芽后喷施65%福美锌或代森锌600倍液，每隔15天喷1次，连喷2-3次；落花后用除菌通800倍液或托布津可湿性粉剂500倍液连续喷3-4次，其中以在4-5月多雨季节喷施最重要。

蚜虫的防治：冬季清园时喷施3-5波美度的石硫合剂，可以杀死越冬虫卵。并认真做好天敌的保护工作，如食野蝇、瓢虫、草蛉等。

桃一点叶蝉的防治：在越冬成虫迁回桃园时，可选用50%杀螟松乳油800倍液或2.5%敌杀死1500倍液喷施。

桑白蚧的防治：喷施2-3波美度的石硫合剂，消灭越冬雌成虫。同时还可进行人工防治，如用硬毛刷刷去枝干上的蚧壳虫体；保护天敌，如红点唇瓢虫、日本方头甲等；做好冬季清园工作，结合修剪，剪除病虫枝并集中烧毁；用生石灰5.0公斤、硫磺0.5公斤、水20公斤配成涂白剂对树干进行刷白。

桃蛀螟的防治：做好冬季清园工作，消灭越冬虫源，及时处理桃蛀螟的越冬寄主，如玉米、向日葵等作物，并集中烧毁。用黑光灯和糖醋液诱杀成虫。在第1代、第2代产卵高峰期喷50%杀螟松1000倍液或高绿宝、虫可毙等1500倍液，对卵、幼虫和成虫都有良好的防治效果。

转载请注明“来源”：四川农村信息网



相关信息



种植哈密瓜如何整枝?

哈密瓜整枝好坏是作为高效高产的重要手段，那如何给哈密瓜整枝?

农业之友

2024-04-09 10:30:04



怎样预防苹果树花期冻害?

四月份是苹果树开花授粉的关键时间节点，果农要密切关注气象信息，做好果树花期冻害的防御工作。

农业科技报

2024-04-08 10:11:47



桃树谢花后如何施肥?

桃树谢花后的管理是重中之重，如果此时桃树生理落果多，幼果小，转青慢，畸形果，流胶病等等，都直接关系到果实的品质和当年的产量。谢花后是幼果快速发育期，那么如何做好桃树谢花后...

农业科技报

2024-04-07 10:14:46



猕猴桃授粉技术要点

最佳时间。给猕猴桃授粉的最佳时间是猕猴桃从现蕾到开花，这段时间大概是35-40天左右。1朵花需要开放2-4天左右，盛花期是3-4天左右。

农业科技报

2024-04-03 10:01:56



2024年苹果春季科学施肥指导意见

环渤海湾苹果产区增施有机肥，提倡有机无机配合；依据土壤测试结果适当调减氮磷钾肥用量，增加钙、镁、硼和锌等微量元素肥料用量。

全国农技推广网

2024-04-02 10:22:09

Load more

