

花木

唐菖蒲主要病虫害的防治方法

来源：农业之友

发布时间：2024-11-28 10:29:27

分享

唐菖蒲常见病害有灰霉病（褐腐病）、干腐病、茎腐病、根腐病（枯萎病）、青霉病、疮痂病、病毒病。



1 灰霉病

此病由病原引起，可侵染叶片、茎秆、花瓣和球茎。叶片感病初期出现黄色至黄褐色小点，后期叶片变黄枯死，基部出现茎腐，花瓣呈水渍状褐色斑点，扩大呈淡褐色，冷凉潮湿时，花朵呈粘性腐烂。球茎表面产生水渍状圆形斑，后变软、腐烂。防治方法：种植前要对种球及土壤进行消毒，保持通风透光，适当减小密度，保持表土干燥。植株感染初期。摘除并销毁带病的花和叶片，采用70%甲基托布津1000 倍液或75%百菌清可湿性粉剂800 液交替使用进行防治。

2 干腐病

干腐病由半知菌唐菖蒲尖镰孢引起的维管束病害，主要危害球茎，也危害叶片、花和根。是唐菖蒲栽培过程中发生的主要病害之一。带病球茎种植于田间，重者不能发芽，或长出纤弱苗，很快死亡；轻者虽可发芽长成正常植株，但最后顶叶变黄，逐渐干枯，直至整株枯死。成株期发病时，外边的叶片尖端开始变黄干枯，花瓣的颜色变深、有些品种花瓣变窄、边缘略卷，花少、花小、向上倾斜，不能充分开放，发病严重时植株生长停滞，地下球茎腐烂，整株枯死。防治方法：选用不带病种球，种植在经过处理的基质上；播种前进行球茎消毒，先用1%高锰酸钾水溶液浸泡6~8h。再用清水冲洗，晾干后种植。发病初期可用50%多菌灵500~600 倍液、75%百菌清800 倍液、70%甲基托布津1000~1500 倍液交替喷雾进行防治。

3 病毒病

唐菖蒲病毒病是世界性病害，凡是种植唐菖蒲地区均有该病发生。常造成植株生长障碍，如茎叶萎缩畸形，叶片产生褪绿斑甚至黄化，植株矮小，花穗变短，花朵变少、变小、变形，影响或失去观赏价值。侵染唐菖蒲病毒病的病原有：黄瓜花叶病毒、菜豆黄花花叶病毒、烟草花叶病毒、烟草环斑病毒、番茄斑萎病毒、番茄环斑病毒、番茄黑斑病毒、烟草脆裂病毒、南芥菜花叶病毒等。防治方法：选择健康不带病毒的种球种植；加强检查，发现发病的植株及时拔除销毁；清除种植地附近的杂草，减少侵染源；喷施杀虫剂防治蚜虫，消灭传毒介体。

虫害

常见的虫害有蛴螬、夜蛾、红蜘蛛、花蓟马、介壳虫、根螨、根结线虫等。

1 蛴螬

蛴螬是金龟子幼虫的总称，咬食根茎，影响种球发芽和生长，造成植株枯死和倒伏。防治方法：保持种植地清洁，翻耕土壤捕杀虫体；严重时可用呋喃丹拌细土撒施进行防治。或用50%辛硫磷乳油1000 倍液浇灌土壤。

2 夜蛾

其幼虫昼伏夜出，啃食嫩叶和花序，造成叶片和花器官残缺不全，严重影响切花品质。防治方法：保持田间环境清洁，清除枯枝杂草。幼虫发生数量少时可夜间人工捕杀，严重时用90%敌百虫1000 倍液喷雾，成虫可用灯光诱杀。

3 红蜘蛛

主要危害茎叶，吸食叶内养分，使叶片呈现许多灰白色小斑点，影响植物的光合作用，严重时叶片变为黄褐色继而干枯脱落。防治方法：清除田间杂草，注意种植环境的湿度，制造不适宜红蜘蛛生存的环境。发病时可用三氯杀螨砜可湿性粉剂800 倍液或40%三氯杀螨醇乳油1000 倍液喷雾防治。喷药时要注意均匀喷湿叶背和缝隙处，间隔5~7 天连续喷施2~3次，并用不同农药交替使用。

4 花蓟马

以若虫和成虫吮吸花的汁液，在花瓣上产生灰白色的斑点和产卵痕，严重时引起花瓣卷缩。防治方法：可悬挂蓝色黏板诱杀、或用2.5%溴氰菊酯乳油4000 倍液喷雾防治。花蓟马怕见光，喷药时应使药液到达隐匿之处。

转载请注明“来源”：四川农村信息网



相关信息



芦荟为什么越养越干瘪？

不少人的家中都种有芦荟，有一定的观赏价值，芦荟是我们日常生活中最常见的植物之一，许多花友养殖芦荟都会出现芦荟干瘪的情况，这是什么原因造成的？芦荟为什么越养越干瘪？

农资招商网

2025-03-19 10:19:52



多肉怎么浇水？

春季和秋季：这两个季节气候温和，适合多肉生长，建议大约每10天浇水一次。

花百科

2025-03-18 10:14:29



兰花老芦头怎么孵化？

兰花是我国国花，是观花观叶植物，开花时有独特的花香，从古至今备受人们喜欢。

惠农网

2025-03-17 11:14:53



多肉叶片扦插方法

多肉植物非常的漂亮，也非常的好繁殖，一般我们知道的景天科的植物，多肉植物都是可以通过叶片繁殖的，那么多肉叶片怎么繁殖？

农百科

2025-03-14 09:54:52



吊兰怎么养才能更旺盛？

吊兰一般建议每年换盆一次，但具体换盆频率还需根据植株的实际生长情况来定，为了让吊兰长得更旺盛、叶子更绿油亮。

黔农网

2025-03-13 10:36:15

Load more

