

用户名   自动登录 找回密码

密码   立即注册

请输入搜索内容  搜索

门户 农药施用技术 杀菌剂使用 查看内容

肥料施肥技术  
蔬菜种植技术

农药施用技术  
瓜果种植技术

粮油种植技术  
花木种植技术

食用菌栽培  
药材种植技术

## 抗生素类杀菌剂的使用

2021-5-31 15:34 | 发布者: 种地网 | 查看: 791 | 评论: 0

**摘要:** (1) 多抗霉素。该药为内吸杀菌剂，具有保护和治疗作用，杀菌原理是干扰病原菌细胞壁几丁质的生物合成，芽管和菌丝体接触药剂后会局部膨大、破裂，溢出细胞内含物，导致死亡。主要用于防治多种真菌病害，对细菌...



### (1) 多抗霉素。

该药为内吸杀菌剂，具有保护和治疗作用，杀菌原理是干扰病原菌细胞壁几丁质的生物合成，芽管和菌丝体接触药剂后会局部膨大、破裂，溢出细胞内含物，导致死亡。主要用于防治多种真菌病害，对细菌病害无效。

防治苹果斑点落叶病，于落花后发病初期开始喷10%可湿性粉剂1000~1500倍液，隔10天喷1次，共喷2~3次。

防治苹果霉心病，在现蕾期、开花期和谢花70%左右，各喷1次10%可湿性粉剂1000~1500倍液。

### (2) 农用链霉素。

专供农业使用的链霉素，称之为农用链霉素。主要用于防治作物的细菌性病害。

浸种防治种传细菌性病害，一般用1000毫升/千克浓度药液（相当于72%可溶性粉剂720倍液）浸种1.5小时，捞用清水洗净后催芽播种，可防治黄瓜细菌性角斑病、辣椒疮痂病。

防治番茄溃疡病、青枯病，在移栽时用药液作定根水，每株灌72%可溶性粉剂4000倍液150毫升；当田间发现病株即刻拔除，并用72%可溶性粉剂4000倍液喷洒；对青枯病还可在拔除病株后，向根穴内灌药液500毫升。

### 相关分类

除草剂使用 杀虫剂使用  
植物生长调节剂 杀菌剂使用

- 千日红如何剪枝
- 条纹十二卷开花后怎么办
- 吸财树掉叶子怎么回事
- 观音莲老桩怎么处理
- 多肉观音莲怎么修剪
- 石蒜花有毒吗
- 观音莲怎么嫁接
- 什么是剪秋罗
- 七彩果和人参果的区别
- 网纹草怎么移盆
- 朱砂根不结果的原因
- 五角枫盆景怎样过冬
- 向日葵花做干花的方法
- 千日红怎么养开花多
- 向日葵如何醒花
- 吸毒草耐阴吗
- 夏天锦晃星怎样服盆
- 六出花如何分盆
- 太阳花打蔫怎么办
- 葵花烂头怎么防治



[邀请](#) [收藏](#)

上一篇：[吗啉类杀菌剂使用方法](#)  
 下一篇：[有机杀菌剂的分类及使用](#)

相关阅读

- 戊唑醇的作用有哪些？
- 杀菌剂灌根需注意哪些问题？
- 杀菌剂是什么？分为几种？
- 非内吸型杀菌剂是什么请介绍？
- 杀菌剂作用方式和机理
- 杀菌剂百菌清哪些作物可以使用？
- 果树怎么使用甲壳素系列杀菌剂？
- 有什么办法提高杀菌剂功效？
- 什么是辛菌胺？
- 打杀菌剂怎么提高效果？
- 施用杀菌剂有什么方法能提高药效？
- 杀菌剂有哪些作用其原理是什么？
- 如何使用杀菌剂能提高药效？
- 铜素杀菌剂怎么使用才合理？
- 农用杀菌剂怎么施用？
- 为什么杀菌剂灌根前后不宜浇水？
- 杀菌剂可以防治哪些病害？
- 抗生素类杀菌剂的使用
- 梨树常用杀菌剂及使用方法
- 使用杀菌剂有哪些要注意？