



## 夏季猪热应激症怎样治疗

作者：

日期：2023-07-06 09:36

来源：农业科技报 2023年7月6日6版

字号：[小 中 大]

背景：    

阅读：1647

猪舍内温度达30℃以上时，对猪正常代谢就会产生不利影响。如圈舍温度高、潮湿再加上通风不畅就会引发猪热应激症（中暑）的发生，严重的还会造成死亡。

热应激症的原因及危害：猪是恒温哺乳家畜，依靠神经调控和生物化学反应保持体温恒定。但猪的皮下脂肪厚，汗腺不发达，体内热量通过皮肤散发较慢，所以不耐热。环境温度过高就会引起猪的代谢增强而导致猪免疫力下降、热量失衡，食欲下降。

热应激症的表现：所在环境温度较高时，猪群会表现烦躁不安、食欲减退、口渴明显、饮水增加，继而会突然发病，发病猪精神沉郁或暴躁不安，呼吸急促、心跳加快、结膜潮红，体温升高可达43℃，有的口吐白沫、呕吐，步态不稳及卧地不起，浑身震颤，严重的处于昏迷状态，急性的可死亡。

热应激症的预防与治疗：猪舍周围和栋舍之间，栽种适宜的绿色植物，场周围植树，栋舍之间栽种薄荷、紫苏、曼陀罗、半夏、藿香、薰衣草等矮棵防蚊蝇植物。当夏季气温升高时，就需开启降温设备。要保证圈舍通风良好，可设立降温风扇、水幕帘，也可用舍内喷雾、滴水或在舍内地面喷淋凉水等降温手段。夏季在保证充足饮水的情况下，要选择新鲜、质优的原料配制日粮，提高能量比例、降低粗纤维比例，适当增加微量元素和维生素添加量。

当发现热应激患猪时应立即采取如下治疗措施：通风降温：将病猪移到阴凉通风处，轻症可凉水喷淋头、胸部，冷盐水灌服或灌肠。重症的还需降低颅内压、减轻肺水肿：刺破耳尖血管放血100-200毫升；静脉注射20%樟脑醇100-300毫升，静脉注射5%碳酸氢钠100-200毫升；镇静强心、兴奋呼吸中枢：肌注氯丙嗪50-100毫升，或肌注樟脑磺酸钠5-6毫升，或安钠咖2-3毫升。

保存 复制 打印

发布者：曾鑫滔 审核员：曾鑫滔

