

拟斯卑尔脱山羊草X非洲黑麦属间杂种的形态和减数分裂的研究¹⁾

蒋华仁, 戴大庆¹⁾

四川农业大学农学系, 雅安

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 黑麦属(*Secale*) 是小麦的近缘属之一, 该属有普通黑麦(*S. cereale*)、山地黑麦(*S. montanum*)、非洲黑麦(*S. africanum*), 瓦维洛夫黑麦(*S. vavilovii*) 和森林黑麦(*S. sylvestre*) 五个种【“。其中, 除普通黑麦被广泛用于改进小麦和合成小黑麦外, 其他四种黑麦种基本上没有被利用。

关键词

分类号

Abstract

Key words

DOI:

通讯作者

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(0KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [复制索引](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 无 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [蒋华仁](#)
 - [戴大庆](#)