



大熊猫等8种野生哺乳动物蛔虫的线粒体COXI 和COXII 基因的亲缘关系分析

牛李丽¹, 陈世界², 汪涛³, 古小彬³, 严玉宝², 余华², 邓家波¹, 严慧娟¹, 余星明¹, 陈维刚¹, 王淑贤³, 杨光友^{3*}

(1. 成都动物园, 成都 610041; 2. 四川出入境检验检疫局, 成都 610041; 3. 四川农业大学动物医学院, 雅安 625014)

Genetic Relationship of Ascarid Nematodes from Giant Panda and Seven Other Species of Captive Wild Mammals Based on COXI and COXII Genes

NIU Li-li¹, CHEN Shi-jie², WANG Tao³, GU Xiao-bin³, YAN Yu-bao², YU Hua², DENG Jia-bo¹, YAN Hui-juan¹, YU Xing-ming¹, CHEN Wei-gang¹, WANG Shu-xian³, YANG Guang-you^{3*}

(1. Chengdu Zoological Garden, Chengdu 610041, China; 2. Sichuan Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau, Chengdu 610041, China; 3. College of Veterinary Medicine, Sichuan Agricultural University, Ya'an 625014, China)

摘要

图/表

参考文献

相关文章 (15)

京ICP备07023558号

版权所有 © 2008 《畜牧兽医学报》编辑部

地址: 北京市海淀区圆明园西路2号中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 邮政编码: 100193

Tel: 010-62815987 E-mail: xmsyxb@263.net