

来源：中新网 发布时间：2009-4-23 11:18:26

小字号

中字号

大字号

日研究发现：成人后体重下降者较体重增加者死亡率高

据日本共同社报道，日本厚生劳动省研究小组4月23日公布一项研究结果称，成人后体重有所下降的人群比体重增加的人群死亡率要高。

这项研究以10个都府县的40~69岁男女约9万人为对象，将他们分为20岁起体重减少5公斤以上、增加5公斤以上、基本无变化(增减幅不到5公斤)三类。随后对其展开长达约13年的追踪调查，研究体重的增减与死亡的关系。

男性中，体重下降者的死亡率是几乎无变化者的1.4倍，而体重增加者的死亡率则要低一些。五六十岁人群中，体重下降的人因癌症或循环系统疾病而导致的死亡率较高。

女性中也出现了类似情况，体重下降者的总死亡率是几乎没有变化者的1.3倍。但并未发现癌症或循环系统疾病造成的死亡同体重下降的相关性。

负责调查研究的爱媛大学副教授齐藤功表示：“成人后体重增加的情况十分普遍，可以认为体重下降的人可能受到了某种健康问题的影响。体重下降者有必要注意自身保健。”

发E-mail给： 

打印 | 评论 | 论坛 | 博客

读后感言：

发表评论

相关新闻

美研究称：多食红肉或增加老人死亡率
《科学》：气候变暖致美国西部树木死亡率上升
孕期铁补充可降低中国新生儿死亡率
研究发现：美国亚太裔并发症死亡率比白人高**16%**
《美国心脏病学杂志》：北京烤鸭降心脏病死亡率
研究显示复方制剂可减少糖尿病死亡率
《职业和环境医学杂志》：全球变暖将导致死亡率升高
《新英格兰医学杂志》：糖尿病药文迪雅可能增加心...

一周新闻排行

基金委公布对贺海波、吴理茂的处理决定
美**9**所大学收到神秘捐款
全球变暖造就北极天然心形湖
在美**30**万中国留学生受到经济危机强烈冲击
上海大学一博导抄袭论文被免职 项目成果被撤销
世界数字图书馆问世 可通过互联网免费进入
盘点十大最奇特杂交动物
科研器材造假，有多少试验可以重来