

双相躁狂抑郁症遗传方式的探讨 — X连锁显性遗传模式的检验

祁曙光, 严善明

江苏省镇江精神病防治院

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 躁狂抑郁症遗传学研究已可以肯定遗传因素是发病的重要因素之一。自1959年Leonhard 认为遗传效应对双相躁狂抑郁症较单相型更为突出后, Perris (1966), Angest (1966) 及Winokur (1967) 等又提供资料支持这一看法, 但认为双相型与单相型的遗传背景有所不同。一般以X连锁显性遗传和常染色体显性遗传的推测为多, h, , 一, , 亦有许多学者认为此病属多基因遗传 (a。国内有关的专题报告较少[2, 3]。一为了探讨双相躁狂抑郁症可能的遗传方式, 我们对40例双相躁狂抑郁症患者及其一级亲属进行了家系研究。本文仅对其X连锁显性遗传模式的问题进行分析和讨论。

关键词

分类号

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(0KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [复制索引](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 无 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [祁曙光](#)
 - [严善明](#)

Abstract

Key words

DOI:

通讯作者