

水稻“三明”显性核不育基因的定位

杨泽茂¹, 谢小芳², 黄显波³, 王丰青¹, 童治军¹, 段远霖², 兰涛², 吴为人^{1,2}

1. 浙江大学农业与生物技术学院, 杭州 310000 2. 福建农林大学作物科学学院, 福州 350002 3. 福建省三明市农业科学研究所, 福建沙县365509

Mapping of Sanming dominant genic male sterility gene in rice

YANG Ze-Mao¹, XIE Xiao-Fang², HUANG Xian-Bo³, WANG Feng-Qing¹, TONG Zhi-Jun¹, DUAN Yuan-Ling², LAN Tao², WU Wei-Ren^{1,2}

1. College of Agriculture & Biotechnology, Zhejiang University, Hangzhou 310000, China 2. College of Crop Science, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China 3. SanMing Institute of Agricultural Science, Shaxian 365509, China

摘要

图/表

参考文献

相关文章 (15)

综合新闻 学术会议 遗传咨询 网络资源 学术讨论 科普之窗 新书咨询
科研院所 国内实验室 国外实验室 科学基金 学术团体 生命科学期刊 高新企业
成果展示 生物学家 遗传学史 招生信息 招聘信息 人才推荐 学风建设

© 中国遗传学会 中国科学院遗传与发育生物学研究所 欢迎阅读及检索本刊 引用时请注明出处