

应用时间分辨荧光免疫分析技术检测SARS病毒抗原的初步研究

严重急性呼吸综合症(SARS)是一种新的致死性传染病。2002年底在中国广东省部分地区首先发现,3个月内即很快传播到世界25个国家和地区以及中国其他许多省市,累计报告病例数达8 202人。该病毒传染性强,起病急,在人群中传播率高,容易导致疫情爆发且死亡率较高(5%~6%) [1] [2]。

目前世界上许多实验室都在研制快速和早期检测SARS病毒的方法,已建立的方法主要包括酶联免疫吸附法(ELISA),免疫荧光法(IFA)和RT-PCR。但这些方法,无论是检测抗原或者抗体,都很难满足早期诊断的需要[3][4][5][6][7]。时间分辨免疫荧光分析(timed-resolved fluoroimmunoassay, TRFIA)是上个世纪80年代兴起的一种新型检测手段,它除了具有高灵敏度、特异性外,还有检测范围宽,对标记物分子生物活性影响小,无放射性污染,标记物保存时间长等优点,是对SARS病毒抗原进行多指标检测并实现SARS的早期诊断的一种优选方法[8][9][10][11][12][13]。

1 材料和方法

1.1 材料

SARS-CoV N蛋白由南方医科大学珠江医院车小燕教授提供(0.70 mg/ml);抗SARS病毒N蛋白的单克隆抗体,由本实验室制备;SARS灭活病毒由本室提供,经荧光定量PCR检测确定拷贝数为 8.1×10^4 copies/ml;用肺炎雷伯菌、纯化流感病毒、副流感病毒、丙型肝炎病毒、肺炎衣原体、肺炎支原体抗体检测试剂盒为康润生物制品公司产品;正常人血清由南方医院血液科提供。

96孔微孔板(8×12)为lab system公司产品;Eu³⁺标记试剂试剂盒购自Perkin Elmer公司;Sephadex G50为Pharmacia产品;超滤离心管为美国Millipore公司产品;荧光测量仪为Auto-Delfia 1235全自动时间分辨免疫荧光检测仪;Multiskan Ascent酶标仪及Wellwash AC洗板机购自Thermo Lab system公司。SARS荧光定量PCR检测试剂盒购自中山大学达安股份有限公司;SARS ELISA试剂盒由南方医科大学珠江医院车小燕教授惠赠。

1.2 方法

1.2.1 抗SARS N蛋白单克隆抗体配对实验 按文献[14]方法制备抗SARS N蛋白单克隆抗体(本室自制)。将制备得到的这些抗SARS N蛋白单克隆抗体经过半饱和硫酸铵沉淀后,离心去上清,再溶解透析并测蛋白含量,最后按改良过碘酸钠法标记上辣根过氧化物酶(HRP)。

将抗SARS N蛋白单克隆抗体按2 μg/ml的浓度包被微孔板,每孔100 μl,4℃过夜,洗板,在每株抗体包被板中均加入1:5,1:500,1:5 000,1:50 000不同稀释度的SARS灭活病毒和阴性血清,100 μl/孔,室温孵育30 min,洗板,再分别加入HRP标记的抗体,同样孵育30 min,加底物显色液,最后在酶标仪上测D(λ)值。根据D(λ)值选择出两株亲和力高、稳定性强的单抗,并将该包被的单抗作为最佳包被单抗,HRP标记的单抗作为最佳标记单抗。

1.2.2 固相包被抗体的制备 将上述筛选出来的最佳包被单抗用50 mmol/L、pH9.6的碳酸盐缓冲液稀

释至5 $\mu\text{g}/\text{ml}$ ，然后每孔100 μl 加入96孔微孔板中，4 $^{\circ}\text{C}$ 过夜，弃包被液，加入封闭液(去金属离子2%BSA)，每孔250 μl ，封闭过夜或37 $^{\circ}\text{C}$ 2 h，弃封闭液，洗涤后真空抽干-20 $^{\circ}\text{C}$ 冷冻保存。

1.2.3 Eu^{3+} 标记抗体的制备及纯化 用上述筛选出来的最佳标记单抗参照 Eu^{3+} 标记试剂盒说明书进行标记。标记完成后上 Sephadex G50层析柱(1 \times 30 cm)分离纯化，洗脱液(50 mmol/L Tris-HCl, 0.9% NaCl)洗脱，同时收集洗脱液(1 ml/管)，逐管测量吸光度(D_{280})，合并峰管，测定蛋白含量，同时以PerKin Elmer公司 Eu^{3+} 标记试剂盒中的 Eu^{3+} 标准测定合并峰管的 Eu^{3+} 浓度。所得标记率(Eu^{3+} mol/IgG)是8.96，蛋白回收率为84%。

1.2.4 TRFIA检测SARS病毒 采用平衡饱和法中的两步法，在上述的包被板中加入0.02, 0.1, 0.5, 1.00, 10.00, 50.00, 150.00 ng/ml梯度稀释的SARS重组N蛋白各100 μl ，37 $^{\circ}\text{C}$ 震荡孵育1 h后，洗涤液洗板4次，再每孔中加入1:50稀释的铕标记抗体100 μl ，室温震荡孵育2 h，洗涤液洗板6次后加入200 μl 增强液振摇5 min后检测荧光值，以上全部操作过程均在Auto-Delfia 1235荧光检测仪上进行。

1.3 方法学评价

1.3.1灵敏度和特异性检测 将SARS-CoV N蛋白稀释成不同浓度进行测定，并以SARS N蛋白稀释浓度为横坐标，荧光反应单位为纵坐标，绘制标准曲线。

以零剂量当作被测样品进行20次重复测量，计算其均值及标准差，将均值加上2倍的标准差所得的荧光值代入标准曲线，得到相应的浓度即为其最低检测量[15]。

特异性检测：用肺炎雷伯菌、纯化流感病毒、副流感病毒、丙型肝炎病毒、肺炎衣原体、肺炎支原体全抗原代替SARS-CoV N蛋白进行特异性检测。

1.3.2 准确度和精密度检测 将SARS N蛋白加入正常人血清中，制备低(5.6 ng/ml)、中(28 ng/ml)、高(56 ng/ml)3个浓度，进行回收实验。

用低、中、高(同上)3个浓度SARS N蛋白分别进行批内和批间精密度测试，重复次数为8次，并对测定结果进行分析。

1.3.3 与ELISA试剂盒进行比较检测 将本室自制的SARS灭活病毒(荧光定量PCR确定其拷贝数为 8.1×10^4 Copies/ml)按1:2-1:256倍比稀释，使用ELISA试剂盒检测，同时进行TRFIA对照检测，并对检测结果进行分析。

1.4 数据分析

TRFIA测量所得数据经Auto DEFIA 1235自带的Log-Logit函数处理程序处理绘制SARS-TRFIA标准曲线。其他数据均采用统计软件SPSS 10.0进行t检验。

2 结果

2.1 SARS单抗的配对筛选实验

经夹心ELISA配对实验测定，得到两株特异性好、亲和力高的抗SARS N蛋白的单克隆抗体(C039和C008)，两株抗体均达到临床诊断试剂的亲和力要求，并确定最佳包被抗体为C039，最佳标记抗体为C008。

2.2 方法学评价

2.2.1 灵敏度及特异性结果 由数据分析所得的标准曲线可知，测量的线性范围在0.02~150 ng/ml。以零剂量点发光值均值加2s后的发光值在标准曲线上得到相应的SARS病毒最小可测值为0.02 ng/ml(图1)。将肺炎雷伯菌、纯化流感病毒、副流感病毒、丙型肝炎病毒、肺炎衣原体、肺炎支原体全抗原全抗原代替SARS-CoV N蛋白进行TRFIA检测，均无明显交叉反应。




图1 SARS TRFIA标准曲线

Fig.1 Standard curve of TRFIA for SARS N protein detection
TRFIA: Timed-resolved fluoroimmunoassay

2.2.2 准确度和精密度检测结果 低、中、高(同上)三个浓度SARS N蛋白分别进行批内和批间精密度测试,重复次数为8次,得到批内和批间CV分别为3.3%~6.2%, 5.3%~9.6%(表1);将SARS N蛋白加入正常人血清中,制备低(5.6 ng/ml)、中(28 ng/ml)、高(56 ng/ml)三个浓度,进行回收实验所得到的回收实验结果表明,回收率在90.2%~106%之间(表2)。

表1 批内、批间精密度测试结果(n=8)

Group	Intra-assay		Extra-assay	
	N protein (ng/ml)	CV (%)	N protein (ng/ml)	CV (%)
Low	0.98±0.08	4.1	1.02±0.11	9.4
Medium	25.60±1.20	3.3	25.39±1.08	5.3
High	55.22±3.19	6.2	55.20±3.74	9.6

表2 回收率实验

Sample concentration for quality control (ng/ml)	Actual measurement (ng/ml)	Mean recovery rate (%)
Low (5.60)	5.05 (4.86-5.94)	90.2
Intermediate (28.0)	29.8 (26.9-31.2)	106
High (56.0)	53.6 (51.2-60.3)	95.7

2.2.3 与ELISA的比较 将本室自制的SARS灭活病毒(荧光定量PCR确定其拷贝数为 8.1×10^4 copies/ml)按1:2~1:256倍比稀释,使用ELISA试剂盒检测,同时进行TRFIA对照检测,并将测量结果进行比较(表3)。对所得数据作t检验,两者测得结果间无显著差异(P>0.05)。

表 3 灭活病毒稀释度和测定值的关系

Tab.3 Association between dilutions of the inactivated virus and detected value

Titer	TRFIA	ELISA
1:2	+	+
1:4	+	+
1:8	+	+
1:16	+	+
1:32	+	+
1:64	+	+
1:128	+	-
1:256	-	-

3 讨论

本实验建立的检测SARS CoV的TRFIA是一种新型的体外超微量分析技术。它利用了具有独特荧光特性的镧系元素及其螯合物为示踪物来标记抗体、抗原、激素、多肽、蛋白质、核酸探针及生物素；待反应体系发生后，用时间分辨荧光免疫分析检测仪测定反应产物中的荧光强度。根据产物荧光强度和相对荧光强度的比值，判断反应体系中分析物的浓度，从而达到定量分析。稀土元素有两个特点，第一个是它的荧光激发光波长范围宽，因此TRFIA的检测范围也较宽；另一个特点是荧光衰变时间长，荧光衰变期在500 μs 以上，而非特异背景荧光的生存期仅为0.01 μs 左右，用时间分辨荧光分析仪进行延迟检测，可消除非特异荧光的干扰，提高方法的灵敏度。与传统的放免和酶免等标记免疫技术相比，TRFIA具有标记物制备简单、示踪物稳定、多标记有效期长、不污染环境、不受样本自然荧光干扰、标准曲线量程宽、应用范围十分广泛，以及高精度、自动化、灵敏度高、大样本快速测定等技术优点[16]。

本研究所建立的方法适用于测量血清SARS的含量。我们曾把高含量的SARS灭活病毒血清样品经1:5至1:500稀释后用于本方法的测定，并用该系列稀释血清代替SARS-CoV N蛋白的参考标准作标准曲线，其斜率与SARS的标准曲线斜率基本一致，表明SARS-TRFIA有良好的健全性，血清基质对本方法没有明显影响。批内变异系数为3.3%~6.2%，批间变异系数为5.3%~9.6%，系统精确度较高，证明本方法是可靠的。同批试剂连续5个月应用分析，发现标准曲线基本重合，无明显漂移，可以用同批试剂单次标准曲线作为今后分析的固定参考。另外，SARS TRFIA的分析时间仅为1 h，而全自动时间分辨荧光测量仪的使用，使分析系统高度自动化，这样可提高临床检验速度，加大检验数据量，又可大幅度减低认为误差和增加检出结果的可靠性。

由于SARS病人样品的来源受限制，所以该试剂的一些性能指标还未评价，如在临床样品中的应用情况，试剂检测病毒数的阈值(N蛋白量与活病毒数的关系)等。但该试剂能够与细胞培养的SARS病毒发生反应，表明该试剂具有潜在的应用价值。可用于非典疾病的诊断、SARS病毒携带者的筛选、药物筛选过程中病毒含量的监测、疫苗注射后免疫效果的监测及基础医学研究等。

参考文献:

- [1] Drosten C, Gnther S, Presier W, et al. Identification of a novel coronavirus in patients with severe acute respiratory syndrome[EB/OL]. <http://www.nejm.org>. 2003, 4.
- [2] Ksiazek TG, Erdman D, Goldsmith CS, et al. SARS Working Group. A novel coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome[J]. N Engl J Med, 2003,

[3] WHO. Severe acute respiratory syndrome(SARS):laboratory diagnostic tests [EB/OL]. <http://www.who.int/csr/sars/en/>.

[4] Yu LS, Yi YP, Li P, et al. Diagnosis of severe acute respiratory syndrome(SARS)by detection of SARS coronavirus nucleocapsid antibodies in an antigen-capturing enzyme-linked immunosorbent assay[J]. J Clin Microbiol, 2003, 41(12): 5781-2.

[5] SARS virus close to conclusive identification, new tests for rapid diagnosis ready soon SARS-multi-country outbreak [EB/OL]. <http://www.who.int/csr/don>, 2003-03-27b, 2003-04-17.

[6] 吴新伟, 程刚, 狄飏, 等. 荧光聚合酶链反应检测严重急性呼吸综合症冠状病毒的方法建立及临床初步应用[J]. 中华检验医学杂志, 2003, 26(5): 300-6.

Wu XW, Cheng G, Di B, et al. Establishment of fluorescent PCR method for detection of SARS coronavirus and the clinical trial[J]. Chin J Lab Med, 2003, 26(5): 300-6.

[7] Drosen C, Gunther S, Preiser W, et al. Identification of a novel coronavirus in patients with severe acute respiratory syndrome[J]. ew Engl J Med, 2003, 348:1978-85.

[8] Gailard O, Kapel N, Galli J, et al. Time-resolved fluorometry:principles and applications in clinical biology[J]. Ann Biol Clin, 1994, 52(11): 751.

[9] Rasi S, uvanto E, Vilpo LM, et al. Time-resolved fluoroimmunoassay of 5-methyl-2-deoxycytidine employing europium-labeled antigen as tracer[J]. J Immunol Methods, 1998, 117(1): 33.

[10] Wang GJ, Lapcik O, Hampl R, et al. Time-resolved flroroimmunoassay of plasma daidzein and genistein[J]. Steroids , 2000, 65(6): 339-48.

[11] Mehto P, Ankelo M, Hinkkanen A, et al. A time-resolved flroroimmunoassay for the detection of microcystins, cyanobacterial peptede hepa to toxins[J]. Toxin, 2001, 39: 831-36.

[12] Uehara M, Lapcik O, Hampl R, et al. Rapid analysis of phytoestrogens in human urine by time-resolved fluoroimmunoassay[J]. Steroid Biochem Mol Biol, 2000, 72(5): 273-82.

[13] Fluoroimmunoassay of plasma and urine 0-desmethy langolensin[J].Steroid Biochem Mol Biol, 2002, 81(4-5): 353-61.

[14] 车小燕, 丘立文, 潘玉先, 等. SARS冠状病毒N蛋白单克隆抗体的快速、高效制备的方法研究[J]. 第一军医大学学报, 2003, 23(7): 640-2.

Che XY, Qiu LW, An YX, et al. Rapid and efficient preparation of monoclonal antibodies against SARS-associated coronavirus nucleocapsid protein by immunizing mice[J]. J First Mil Med Univ/ Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao, 2003, 23(7): 640-2.

[15] 黄飏, 肖龙华, 朱利国, 等. HBeAg时间分辨荧光免疫分析法的建立[J]. 标记免疫分析与临床, 2002, 9(2): 96-8.

Huang B, Xiao LH, Zhu LG, et al. Time-resolved fluoroimmunoassay of HBeAg[J]. Labeled Immunoassays Clin Med, 2002, 9(2):96-8.

[16] Mitunen K, Pettersson K, Piironen T, et al. Dual-label one-step immunoassay for simultaneous measurement of free and total prostate-specific antigen concentrations and ratios in serum[J]. Clin Chem, 1995, 41: 1115-20.

- [1] Drosten C, Gunther S, Presler W, et al. Identification of a novel coronavirus in patients with severe acute respiratory syndrome[EB/OL]. <http://www.nejm.org>. 2003, 4.
- [2] Ksiazek TG, Erdman D, Goldsmith CS, et al. SARS Working Group. A novel coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome[J]. *N Engl J Med*, 2003, 348:1953-66.
- [3] WHO. Severe acute respiratory syndrome(SARS):laboratory diagnostic tests [EB/OL]. <http://www.who.int/csr/sars/en/>.
- [4] Yu LS, Yi YP, Li P, et al. Diagnosis of severe acute respiratory syndrome(SARS)by detection of SARS coronavirus nucleocapsid antibodies in an antigen-capturing enzyme-linked immunosorbent assay[J]. *J Clin Microbiol*, 2003, 41(12): 5781-2.
- [5] SARS virus close to conclusive identification, new tests for rapid diagnosis ready soon SARS-multi-country outbreak [EB/OL]. <http://www.who.int/csr/don>, 2003-03-27b, 2003-04-17.
- [6] 吴新伟, 程刚, 狄飏, 等. 荧光聚合酶链反应检测严重急性呼吸综合症冠状病毒的方法建立及临床初步应用[J]. *中华检验医学杂志*, 2003, 26(5): 300-6.
- Wu XW, Cheng G, Di B, et al. Establishment of fluorescent PCR method for detection of SARS coronavirus and the clinical trial[J]. *Chin J Lab Med*, 2003, 26(5): 300-6.
- [7] Drosten C, Gunther S, Preiser W, et al. Identification of a novel coronavirus in patients with severe acute respiratory syndrome[J]. *N Engl J Med*, 2003, 348:1978-85.
- [8] Gailard O, Kapel N, Galli J, et al. Time-resolved fluorometry:principles and applications in clinical biology[J]. *Ann Biol Clin*, 1994, 52(11): 751.
- [9] Rasi S, Luovanto E, Vilpo LM, et al. Time-resolved fluoroimmunoassay of 5-methyl-2-deoxycytidine employing europium-labeled antigen as tracer[J]. *J Immunol Methods*, 1998, 117(1): 33.
- [10] Wang GJ, Lapcik O, Hampl R, et al. Time-resolved fluoroimmunoassay of plasma daidzein and genistein[J]. *Steroids*, 2000, 65(6): 339-48.
- [11] Mehto P, Ankelo M, Hinkkanen A, et al. A time-resolved fluoroimmunoassay for the detection of microcystins, cyanobacterial peptide hepatotoxins[J]. *Toxin*, 2001, 39: 831-36.
- [12] Uehara M, Lapcik O, Hampl R, et al. Rapid analysis of phytoestrogens in human urine by time-resolved fluoroimmunoassay[J]. *Steroid Biochem Mol Biol*, 2000, 72(5): 273-82.
- [13] Fluoroimmunoassay of plasma and urine O-desmethylangolensin[J]. *Steroid Biochem Mol Biol*, 2002, 81(4-5): 353-61.
- [14] 车小燕, 丘立文, 潘玉先, 等. SARS冠状病毒N蛋白单克隆抗体的快速、高效制备的方法研究[J]. *第一军医大学学报*, 2003, 23(7): 640-2.
- Che XY, Qiu LW, An YX, et al. Rapid and efficient preparation of monoclonal antibodies against SARS-associated coronavirus nucleocapsid protein by immunizing mice[J]. *J First Mil Med Univ/ Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao*, 2003, 23(7): 640-2.
- [15] 黄飏, 肖龙华, 朱利国, 等. HBeAg时间分辨荧光免疫分析法的建立[J]. *标记免疫分析与临床*, 2002, 9(2): 96-8.
- Huang B, Xiao LH, Zhu LG, et al. Time-resolved fluoroimmunoassay of HBeAg[J]. *Labeled Immunoassays Clin Med*, 2002, 9(2):96-8.
- [16] Mitunen K, Pettersson K, Piironen T, et al. Dual-label one-step immunoassay for simultaneous measurement of free and total prostate-specific antigen concentrations and

[回结果列表](#)