

药物与临床

以泼尼松为主联合治疗多发性肌炎和皮肌炎32例

沈凌汛,刘巧红,黄安斌,余立凯

华中科技大学同济医学院附属协和医院风湿免疫科, 武汉430022

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的: 比较泼尼松联合疗法和单用治疗多发性肌炎 (PM) 和皮肌炎 (DM)的疗效。方法: PM和DM患者67例分为对照组(单用糖皮质激素)35例, 给予泼尼松 $1\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$, qd。治疗组 32例, 给予泼尼松 $1\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$, qd, 加甲氨蝶呤片 $7.5\sim 10.0\text{ mg}$, po, 每周1次; 加火把花根片3片, tid。疗程4周。主要观察指标有肌力变化, 皮疹, 血清 ALT、AST、LDH、CK的水平及药物副作用发生率。结果: 治疗后两组患者的肌力均有不同程度改善, 肌力改善幅度 ≥ 2 级患者在对照组中占54.3%, 在治疗组中占62.5%, 二者差异无显著性($P>0.05$)。两组患者在治疗后血清 ALT、AST、LDH、CK水平均比治疗前有明显下降, 差异有极显著性($P<0.01$)。治疗组患者的血清ALT、AST、LDH、CK下降的幅度明显大于对照组, 差异有显著性($P<0.05$)。结论: 与单用糖皮质激素的疗法相比, 联合治疗方法能够使血清肌酶更快地下降, 对PM和DM有更好的近期疗效。

关键词 [泼尼松](#) [火把花根片](#) [甲氨蝶呤](#) [肌炎,多发性](#) [皮肌炎](#)

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [1004-0781 \(2004\) 04-0234-02](#)

通讯作者:

作者个人主页: 沈凌汛;刘巧红;黄安斌;余立凯

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(1061KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“泼尼松”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [沈凌汛](#)

• [刘巧红](#)

• [黄安斌](#)

• [余立凯](#)