

临床医学

逐瘀通脉胶囊对短暂性脑缺血发作颈动

张荣伟, 张惠敏

(中国医科大学附属第一医院干诊科, 辽宁 沈阳 110001)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的: 探讨逐瘀通脉胶囊对短暂性脑缺血发作(TIA)患者颈动脉粥样硬化斑块和血脂水平的影响。方法: 65例有颈动脉粥样硬化斑块的TIA患者随机分为2组, 观察组口服逐瘀通脉胶囊及阿斯匹林, 对照组仅口服阿斯匹林, 均为3个月。治疗前后进行颈动脉超声检查, 观察颈动脉内膜-中膜厚度(IMT)、斑块面积; 采用全自动生化分析仪检测血脂水平; 比较3个月内2组脑血管事件的发生率。结果: 治疗后, 观察组血清胆固醇、低密度脂蛋白、甘油三酯与治疗前比较明显下降($P < 0.01$); 观察组颈动脉IMT变薄、斑块面积减少, 与对照组比较差异显著($P < 0.01$); 观察组脑血管事件的发生率为9.7%, 对照组为20.1%, 2组间差异无显著性($P > 0.05$)。结论: 逐瘀通脉胶囊不仅有调节血脂作用, 并能缩小或稳定TIA患者的颈动脉粥样硬化斑块。

关键词 [逐瘀通脉胶囊](#); [短暂性脑缺血发作](#); [颈动脉粥样硬化斑块](#)

分类号 [R74](#)

DOI:

通讯作者:

张荣伟 zhang_rongwei916@126.com

作者个人主页: 张荣伟; 张惠敏

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (303KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ 本刊中 包含“[逐瘀通脉胶囊](#); [短暂性脑缺血发作](#); [颈动脉粥样硬化斑块](#)”的 [相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [张荣伟](#)

· [张惠敏](#)