



您当前的位置是: 首页 >> 资料库 >> 2006期 >> 第1期

硝酸甘油舌下滴服对麻醉苏醒期高血压的影响

许菊霞 周春莲 王惠琴

(浙江省台州医院麻醉科 浙江台州 浙江省台州医院麻醉科 浙江台州)



资料库



阅读全文
READ THE FULL TEXT

浏览次数 241313

2007年		
第1期	第2期	第3期
第4期		
2006年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2005年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2004年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
第7期	第8期	第9期
第10期	第11期	第12期
2003年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

[摘要] 目的比较硝酸甘油舌下滴服与滴鼻对苏醒期高血压的降压效果及舒适度。方法硝酸甘油5 mg用生理盐水稀释至10 ml备用。100例全麻术后高血压病人分为舌下滴服组、滴鼻组各50例。舌下滴服组示其舌头上翘,不能上翘者用消毒棉签轻轻挑起舌头后往舌下滴入配制好的硝酸甘油0.5 ml。滴鼻组用生理盐水棉签清洁两侧鼻腔后滴入硝酸甘油0.5 ml。给药后1、3、5、10、15 min记录血压、心率。观察15 min,无效者则予第2次给药。结果两种方法均可使苏醒期血压下降至基础水平,1~3 min起效,5 min达到最大效应,维持15~30 min。两组血压下降速度及下降水平无显著性差异(P>0.05)。两组用药次数无显著性差异(P>0.05)。滴鼻组有17例诉鼻腔刺激不适,9例有刺激味、恶心想;而舌下滴服组仅11例诉有刺激味,2例有恶心想。结论硝酸甘油舌下滴服与硝酸甘油滴鼻相比,在苏醒期高血压病人中同样具有操作简便、快速、安全、有效等优点,舌下滴服较滴鼻的方法更能减轻病人痛苦。

[关键词] 硝酸甘油 麻醉苏醒期 高血压 舌下滴服 滴鼻

[中国分类号] [文献标识码] [文章编号]

()

[Key words]

【关闭窗口】

2002年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2001年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期
2000年		
第1期	第2期	第3期
第4期	第5期	第6期

COPYRIGHT © 护理学报 地址：广州市广州大道北1838号 技术支持：网天科技

您是第 **299615** 位访客