

论文

2004-2005年珠海市自杀死亡人群死因回顾调查

李德云¹;陈琦¹;梁小冬¹;吴少芳¹;陈国荣¹;陈惠娟¹;吴兆伦²;周伴群²

1.珠海市疾病预防控制中心,广东,珠海,519002; 2.珠海市斗门区疾病预防控制中心

摘要:

目的 了解珠海市人群自杀死亡流行特征及自杀模式,为自杀干预提供决策依据.方法 应用2004-2005年珠海市户籍居民死因监测资料,描述珠海市人群自杀死亡的流行病学特征.结果 2004-2005年间珠海市户籍人群平均自杀死亡率为10.32/10万,标准化率为10.78/10万,是继交通事故之后的第2位伤害死亡原因;其中男性和女性、农村和城市的标准化率分别为13.91/10万、7.01/10万、13.50/10万、6.32/10万,男性高于女性($u=4.11, P<0.01$),农村高于城市($u=4.59, P<0.01$);2年平均自杀死亡率随着年龄的增长而增加,60岁以上增加明显,且多为老年男性;自杀方式以自缢和服毒居多,占有自杀死亡的77.20%.结论 珠海市户籍人群平均自杀死亡率低于全国平均水平;其自杀模式既具有中国人群的自杀模式特征,农村高于城市,且主要为自缢和服毒;又具有国外自杀模式特征,男性明显高于女性,且多发生在老年男性人群.预防控制重点为农村地区 and 老年人群,主要措施为提高生活质量,加强农村基层卫生服务、健康教育和农药管理等.

关键词: [自杀死亡](#) [流行特征](#) [户籍人群](#)

收稿日期 2007-04-02 修回日期 网络版发布日期 2008-09-08

DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2007.12.833

基金项目:

通讯作者: lideyun@126.com.

作者简介:

本刊中的类似文章

文章评论

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text" value="4389"/>

扩展功能

本文信息

- Supporting info
- PDF(590KB)
- [HTML全文](1KB)
- 参考文献[PDF]
- 参考文献

服务与反馈

- 把本文推荐给朋友
- 加入我的书架
- 加入引用管理器
- 引用本文
- Email Alert
- 文章反馈
- 浏览反馈信息

本文关键词相关文章

- 自杀死亡
- 流行特征
- 户籍人群

本文作者相关文章

PubMed