

论文

2002-2006年浙江省居民自杀死亡及相关危险行为分析

胡如英; 王浩; 龚巍巍; 俞敏

浙江省疾病预防控制中心, 浙江 杭州 310009

摘要:

目的 分析浙江省近5来自杀死亡特征及相关危险行为因素,为自杀预防和控制提供信息。方法 采用浙江省公共卫生监测系统2002-2006年死亡监测资料,运用ICD-10死因分类,比较不同地区、不同年龄性别的自杀水平和变化趋势。结果 浙江省2002-2006年自杀平均死亡率为9.28/10万,农村(11.27/10万)高于城市(5.72/10万),男性(10.33/10万)高于女性(8.19/10万),自杀死亡率随年龄增加而升高,65岁以上老年人达到34.69/10万。自杀方式以服农药和自缢居多,占80.50%,职业以农民为主,占83.59%,自杀发生时间以春夏居多,占55.63%。有40.60%家庭存放农药,随意放置占25.32%。结论 浙江省自杀死亡率低于全国水平;自杀预防重点人群为老年人和青壮年,重点地区为农村。应针对重点人群,开展以规范农药管理、完善社会保障体系、强化健康教育等为主的综合干预措施。

关键词: [自杀](#) [死亡率](#) [死亡登记](#)

收稿日期 2007-07-05 修回日期 网络版发布日期 2009-02-26

DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2008.6.384

基金项目:

通讯作者: ryhu@cdc.zj.cn

作者简介:

本刊中的类似文章

1. [刘岭;郭晓荣;宫惠荣;杨彩玲.陕西省眉县妇女自杀死亡现状及影响因素分析\[J\]. 疾病监测, 2005,20 \(12\): 667-670](#)
2. [杨昭;张茂镛;李云涛;沈岚;李志坤.2004年昆明市居民自杀死亡状况分析\[J\]. 疾病监测, 2007,22\(5\): 342-343](#)
3. [李德云;陈琦;梁小冬;吴少芳;陈国荣;陈.2004-2005年珠海市自杀死亡人群死因回顾调查\[J\]. 疾病监测, 2007,22\(12\): 833-835](#)

文章评论

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text" value="7233"/>

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(507KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(1KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

- ▶ [自杀](#)
- ▶ [死亡率](#)
- ▶ [死亡登记](#)

本文作者相关文章

PubMed