

## 论文

### 2004-2007年浙江省舟山市梅毒报告发病监测分析

陈国水, 张行钦, 蒲柳艳, 李以放

浙江省舟山市定海区疾病预防控制中心, 浙江舟山316000

#### 摘要:

目的分析2004-2007年浙江省舟山海岛梅毒报告发病监测结果。方法对监测数据用流行病学描述性研究方法进行统计分析。结果舟山海岛2004-2007年累计报告各类梅毒3818例, 其中I期占30.17%, II期占22.86%, III期占0.37%, 胎传占4.92%, 隐性占41.67%。梅毒年均报告发病率为98.62/10万, 4年中年均上升率为19.84%, 其中隐性梅毒年均增长率达47.65%。海岛地区梅毒发病女性多于男性, 病例性比1:0.87, 其发病主要在“20~29岁”、“30~39岁”、“40~49岁”3个年龄段, 占报告发病总数的75.72%, 其中男性以“30~39岁”段最高28.05%, 女性则以“20~29岁”段最高34.48%。早期(I期、II期)和隐性梅毒的病例年龄分布, 女性高峰年龄段均比男性小10岁以上, 其中隐性梅毒两性相差20岁左右。梅毒发病职业构成, 以家务(政)及待业者最多41.27%, 其次是渔(船)民14.60%, 尤其是隐性梅毒中渔(船)民占22.12%, 对梅毒传播扩散构成潜在威胁。结论梅毒发病流行已成为严重的公共卫生问题, 亟需采取综合性防控措施, 共同遏制急剧上升态势。

关键词: [梅毒](#); [监测](#); [分析](#)

收稿日期 2008-10-24 修回日期 网络版发布日期

DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2009.05.017

基金项目:

通讯作者:

作者简介:

本刊中的类似文章

文章评论

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text" value="2718"/>

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(904KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(1KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

- ▶ [梅毒; 监测; 分析](#)

本文作者相关文章

PubMed