

论著

原发性腹膜后肿瘤的超声诊断价值

何婉媛¹,毛 枫¹,徐 斌²,黄备建¹,季正标¹,王文平¹

1. 复旦大学中山医院超声诊断科,上海 200032; 2. 江苏省吴江市第一人民医院超声科,江苏 吴江 215200

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的:评价超声对原发性腹膜后肿瘤的诊断价值。方法:回顾性分析手术和病理证实的69例腹膜后肿瘤的超声资料。结果:超声对腹膜后肿瘤的定位诊断正确率为85.5%,定性诊断正确率为52.9%。结论:超声对原发性腹膜后肿瘤定位诊断较为可靠,对其病理类型的诊断有一定帮助,但有一定限度。

关键词 [腹膜后肿瘤](#) [超声检查](#)

分类号 [R735.5](#) [R445.1](#)

DOI:

通讯作者:

作者个人主页: [何婉媛¹](#); [毛 枫¹](#); [徐 斌²](#); [黄备建¹](#); [季正标¹](#); [王文平¹](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#)(1644KB)

▶ [\[HTML全文\]](#)(0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“腹膜后肿瘤”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [何婉媛](#)

· [毛 枫](#)

· [徐 斌](#)

· [黄备建](#)

· [季正标](#)

· [王文平](#)