

◎ 会员登录

用户名:
密 码:
验证码:

J Z F 4 P 看不清?换一张

[登录](#) [注册](#) [忘记密码](#)

◎ 快速通道

[作者投稿](#)
[作者查稿](#)
[编辑审稿](#)
[专家审稿](#)

期刊摘要

> 您当前的位置:网站首页→期刊摘要

轻度听力障碍婴幼儿言语、语音及认知发育的特征及早期治疗的影响 [点击下载全文](#)

张风华, 金星明, 吴皓

青岛, 青岛市妇女儿童医疗保健中心儿保科(张风华); 上海交通大学医学院附属新华医院(金星明、吴皓、张劲松)

基金项目:上海市重点实验室资助项目(06DZ22024); 上海市儿科学重点学科资助项目(T0204); 上海市医学重点学科资助项目(05III002)

DOI:2009年10期

摘要点击次数: 2

全文下载次数: 1

摘要:

目的研究轻度听力障碍婴幼儿言语、语音、认知发育的特征及早期言语康复治疗的影响。方法采用Gesell发育量表分别对59例轻度听力障碍患儿及34例正常儿童进行言语、认知功能评估。18例听力障碍患儿安装了助听器, 并进行了6个月的言语康复治疗。比较患儿言语康复治疗前后以及患儿与正常儿童间在言语及认知发育方面的差异; 采用普通话语音测试对患儿治疗前后语音状况进行评估。结果入选的59例轻度听力障碍患儿中, 言语能DQ值正常者37例(62.71%), 可疑者14例(23.73%), 异常者8例(13.56%); 言语能DQ值异常患儿听力损失程度较言语能发育商(DQ)值正常患儿严重($P<0.05$)。听力障碍组言语能及应人能DQ值均明显低于正常对照组水平($P<0.01$)。18例患儿经早期言语康复治疗后, 其言语能及应人能DQ值均显著提高($P<0.01$); 6例患儿有辅音发音异常表现, 声调均未发现异常, 经早期言语康复治疗后患儿发音功能均得到显著改善。听力障碍组粗大动作、精细动作及应物能DQ值与正常对照组比较, 组间差异均无统计学意义(均 $P>0.05$)。结论轻度听力障碍婴幼儿言语及环境适应、交流能力均明显落后于正常儿童; 部分患儿有发音异常表现; 经早期言语康复治疗后, 患儿言语、语音以及环境适应、交流能力均得到显著改善。

关键词: 轻度听力障碍; 言语; 语音; 认知; 干预

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

版权归《中华物理医学与康复杂志》编辑部所有

本站原创及转载的文章、资料, 其版权均由本站及原作者或原刊载媒介所拥有;

未经版权所有人同意, 任何机构或者个人不得擅自将其作为商业用途。

地址: 武汉市解放大道1095号同济医院 邮编: 430030

电话: (027) 83662874 传真: 83663264 E-mail: cjpmr@tjh.tjmu.edu.cn

本系统由武汉市凯思科技发展有限公司设计开发