

何明伟,于密生,孙海燕,王琦,杨力强,武百山,倪家骥.硬膜外前、侧间隙置管持续注药联合臭氧治疗颈椎间盘突出症的疗效分析[J].中国康复医学杂志,2012,(8):741-743

硬膜外前、侧间隙置管持续注药联合臭氧治疗颈椎间盘突出症的疗效分析 [点此下载全文](#)

[何明伟](#) [于密生](#) [孙海燕](#) [王琦](#) [杨力强](#) [武百山](#) [倪家骥](#)

首都医科大学宣武医院疼痛诊疗中心,北京,100053

基金项目:

DOI:

摘要点击次数: 155

全文下载次数: 115

摘要:

摘要目的:探讨经硬膜外前、侧间隙置管持续注药联合注射臭氧治疗颈椎间盘突出症的临床疗效。方法:57例颈椎间盘突出症患者随机分为两组(A组,n=29例;B组,n=28例),均采用相应部位颈部硬膜外前、侧间隙置管,持续泵入消炎镇痛药物,每隔48h,注射1次,持续药物输注3—4周,共治疗10—11次。A组注射臭氧,B组注射纯氧,分别于治疗前,治疗后72h、1个月、6个月对两组患者进行疼痛评价及疗效随访。结果:治疗前,治疗后72h、1个月、6个月的VAS评分分别为:A组 7.4 ± 1.2 、 0.9 ± 0.4 、 1.4 ± 0.9 和 3.1 ± 1.1 ;B组 7.3 ± 1.3 、 2.5 ± 0.8 、 3.5 ± 1.0 和 4.7 ± 2.1 。治疗后72h、1个月、6个月的优良率分别为:A组96.6%、86.2%和79.3%;B组:85.7%、67.8%和60.7%,治疗后72h、1个月、6个月组间比较差异均有显著性($P<0.05$);治疗后72h、1个月、6个月的平均VAS评分都明显低于治疗前;A组明显低于B组,差异有统计学意义($P<0.05$);各组无明显并发症发生。结论:连续硬膜外前、侧间隙置管持续注药联合注射臭氧或纯氧治疗颈椎间盘突出症临床疗效显著($P<0.05$),前者疗效优于后者($P<0.05$)。

关键词: [颈椎间盘突出症](#) [硬膜外前,侧间隙](#) [持续注药](#) [臭氧](#)

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

您是本站第 2241290 位访问者

版权所有: 中国康复医学会

主管单位: 卫生部 主办单位: 中国康复医学会

地址: 北京市和平街北口中日友好医院 邮政编码: 100029 电话: 010-64218095 传真: 010-64218095

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计 京ICP备10000329号