

黄琼, 梁玲毓, 朱洁. 工伤康复患者的心理健康状况及分析[J]. 中国康复医学杂志, 2012, (8): 749-752

工伤康复患者的心理健康状况及分析 [点此下载全文](#)

[黄琼](#) [梁玲毓](#) [朱洁](#)

广东省工伤康复医院心理科, 广州, 510970

基金项目:

DOI:

摘要点击次数: 149

全文下载次数: 146

摘要:

摘要目的: 探讨住院工伤康复患者的心理健康状况, 为实施心理干预, 促进身体恢复提供依据。方法: 采用症状自评量表(SCL-90)对2727例住院工伤康复患者进行调查。结果: 工伤康复患者心理状况筛查阳性率为62.4%。其躯体化($t=20.84, P<0.001$)、强迫($t=6.26, P<0.001$)、抑郁($t=12.85, P<0.001$)、焦虑($t=10.85, P<0.001$)、恐怖($t=17.35, P<0.001$)和精神病性的因子($t=13.92, P<0.001$)得分明显高于国内常模。女性患者在躯体化($t=-4.60, P<0.001$)、强迫($t=-4.27, P<0.001$)、人际关系敏感($t=-2.16, P<0.05$)、抑郁($t=-4.57, P<0.001$)、焦虑($t=-4.54, P<0.001$)和恐怖因子($t=-7.58, P<0.001$)上的得分明显高于男性患者。受教育程度越低的患者, 在躯体化($t=10.11, P<0.001$)和抑郁因子($t=7.74, P<0.001$)得分越高。未婚组人际关系敏感($t=3.46, P<0.01$)、偏执($t=3.60, P<0.001$)和精神病性($t=2.46, P<0.05$)得分明显高于已婚组; 已婚组躯体化因子($t=-5.10, P<0.001$)得分显著高于未婚组。年龄越低的患者, 在人际关系敏感($t=14.62, P<0.001$)、偏执($t=7.80, P<0.01$)和精神病性因子($t=9.02, P<0.001$)得分上得分越高。结论: 工伤康复患者心理健康状况较差, 受其性别、年龄、受教育程度和婚姻状况影响。

关键词: [工伤康复](#) [症状自评量表-90](#) [心理康复](#)

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

您是本站第 2255970 位访问者

版权所有: 中国康复医学会

主管单位: 卫生部 主办单位: 中国康复医学会

地址: 北京市和平街北口中日友好医院 邮政编码: 100029 电话: 010-64218095 传真: 010-64218095

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计 京ICP备10000329号