

◎ 会员登录

用户名:

密码:

验证码:

RFZ08 看不清?换一张

◎ 快速通道

期刊摘要

> 您当前的位置:网站首页→期刊摘要

肱尺关节分离技术对上肢骨折后肘关节功能障碍的治疗 [点此下载全文](#)

李洁, 李云飞

天津, 天津医院骨科康复中心

基金项目:

DOI:2010年07期

摘要点击次数: 4

全文下载次数: 3

摘要:

目的观察单纯肱尺关节分离技术对肘关节功能障碍的疗效。方法选取因上肢骨折固定制动造成肘关节功能障碍的患者27例,分为对照组14例和观察组13例。对照组采用多种关节松动术与被动牵伸技术相结合的综合治疗方法;观察组则单纯采用肱尺关节分离技术并辅以无痛且无负重的主动运动训练进行治疗。2组患者均于治疗前和治疗1, 2, 4周后采用关节活动度(ROM)与Mayo肘关节功能评分(ME PS)对疗效进行评估。结果治疗前,对照组患者和观察组患者肘关节屈曲的ROM值分别为 $(47.86 \pm 23.35)^\circ$ 和 $(48.46 \pm 22.86)^\circ$, 2组间差别无统计学意义($P > 0.05$)。治疗4周后,2组患者肘关节屈曲的ROM值与组内治疗前比较,差异有统计学意义($P < 0.05$),观察组肘关节屈曲的ROM值为 $(110.00 \pm 20.00)^\circ$,显著优于对照组的 $(80.36 \pm 23.57)^\circ$,且差异有统计学意义($P < 0.05$)。结论单纯的肱尺关节分离技术治疗肘关节功能障碍所取得的疗效明显优于多种关节松动术结合被动牵伸技术的综合治疗方法。

关键词: 肱尺关节分离; 手法治疗; 上肢骨折; 肘关节功能障碍

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

版权归《中华物理医学与康复杂志》编辑部所有

本站原创及转载的文章、资料,其版权均由本站及原作者或原刊载媒介所拥有;

未经版权所有人同意,任何机构或者个人不得擅自将其作为商业用途。

地址:武汉市解放大道1095号同济医院 邮编:430030

电话:(027) 83662874 传真:83663264 E-mail: cjpmmr@tjh.tjmu.edu.cn

本系统由武汉市凯思科技发展有限公司设计开发