

◎ 会员登录

用户名:

密码:

验证码:

2 2 H F 8 看不清?换一张

[登录](#) [注册](#) [忘记密码](#)

◎ 快速通道

[作者投稿](#)

[作者查稿](#)

[编辑审稿](#)

[专家审稿](#)

期刊摘要

> 您当前的位置:网站首页→期刊摘要

针刺联合低频电刺激治疗术后胃瘫综合征患者的疗效观察 [点此下载全文](#)

寿依群, 骆乐, 陈文君

杭州, 浙江大学医学院附属邵逸夫医院康复科, 浙江大学邵逸夫临床医学研究所(寿依群、陈文君、李建华、许志生); 杭州五云山疗养院(骆乐)

基金项目:

DOI:2009年02期

摘要点击次数: 2

全文下载次数: 1

摘要:

目的探讨针刺联合胃起搏体表投影区低频电刺激对腹部手术后胃瘫综合征(PGS)患者的临床疗效。方法共选取24例腹部手术后PGS患者,将其随机分为治疗组和对照组。治疗组给予针刺及胃起搏体表投影区低频电刺激,对照组则服用促胃动力药-莫沙比利,患者于自觉疗效满意后停止治疗,但治疗时间最长不超过20d。观察2组患者治疗前、后胃液量变化情况,并对2组患者治疗次数、痊愈率及有效率等进行统计学比较。结果治疗组患者在胃液减少量、临床痊愈率及治疗次数等方面均显著优于对照组,差异均具有统计学意义($P<0.01$)。结论针刺联合胃起搏体表投影区低频电刺激对腹部手术后PGS患者的疗效明显优于药物(莫沙比利)治疗,能显著缩短治疗时间,提高痊愈率及有效率。

关键词: 针刺; 低频电刺激; 术后胃瘫

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

版权归《中华物理医学与康复杂志》编辑部所有

本站原创及转载的文章、资料,其版权均由本站及原作者或原刊载媒介所拥有;

未经版权所有人同意,任何机构或者个人不得擅自将其作为商业用途。

地址:武汉市解放大道1095号同济医院 邮编:430030

电话:(027)83662874 传真:83663264 E-mail:cjpmr@tjh.tjmu.edu.cn

本系统由武汉市凯思科技发展有限公司设计开发