

◎ 会员登录

用户名:
密 码:
验证码:

6 0 N 0 2

看不清?换一张

◎ 快速通道

期刊摘要

> 您当前的位置:网站首页→期刊摘要

强化运动治疗脑卒中偏瘫患者的疗效观察 [点此下载全文](#)

陈炳, 邱纪方, 张垣

温州, 浙江省温州市中医院康复中心(陈炳、张垣、章国伟、吴红专); 浙江省人民医院康复医学科(邱纪方)

基金项目:温州市卫生局科研课题(2005080B)

DOI:2008年06期

摘要点击次数: 2

全文下载次数: 1

摘要:

目的观察强化运动治疗脑卒中偏瘫患者的疗效。方法脑卒中偏瘫患者60例随机分成治疗组和对照组, 每组30例, 治疗组采用强化运动治疗, 对照组采用常规运动治疗。分别于治疗前、治疗4, 8, 12周后比较2组患者的神经功能缺损(采用NIHSS评分)、运动功能(采用FMA评分)、日常生活活动能力(采用MBI评分)、失语(采用WAB评分)等情况。结果①2组患者治疗前FMA差异无统计学意义($P>0.05$); 治疗8周后2组FMA差异有统计学意义($P<0.05$), 而治疗12周后差异更加显著($P<0.01$)。②2组患者治疗前MBI差异无统计学意义($P>0.05$); 治疗4周后2组MBI差异有统计学意义($P<0.05$), 而治疗8周后差异更加显著($P<0.01$)。③2组患者治疗前WAB差异无统计学意义($P>0.05$), 治疗12周后2组WAB差异有统计学意义($P<0.05$); 而2组患者的NIHSS比较, 差异无统计学意义。结论强化运动治疗与常规运动治疗对脑卒中偏瘫患者的运动功能、日常生活活动能力及语言能力的提高均有良好的促进作用, 但强化运动治疗的作用更明显。两者对神经功能缺损的恢复作用均不明显。

关键词: 脑卒中; 偏瘫; 康复; 强化运动治疗

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

版权归《中华物理医学与康复杂志》编辑部所有

本站原创及转载的文章、资料, 其版权均由本站及原作者或原刊载媒介所拥有;
未经版权所有人同意, 任何机构或者个人不得擅自将其作为商业用途。

地址: 武汉市解放大道1095号同济医院 邮编: 430030

电话: (027) 83662874 传真: 83663264 E-mail: cjpnr@tjh.tjmu.edu.cn

本系统由武汉市凯思科技发展有限公司设计开发