

朱红梅, 卞荣, 王盛. 两种贴扎方法用于治疗脑卒中偏瘫患者肩关节半脱位的疗效观察[J]. 中国康复医学杂志, 2013, (7): 638-641

两种贴扎方法用于治疗脑卒中偏瘫患者肩关节半脱位的疗效观察 [点此下载全文](#)

[朱红梅](#) [卞荣](#) [王盛](#)

南京体育学院运动人体科学系, 210014

基金项目:

DOI:

摘要点击次数: 144

全文下载次数: 99

摘要:

摘要 目的: 从减轻脱位程度的角度观察两种贴扎方法对脑卒中患者肩关节半脱位的治疗效果。方法: 选择10例具有肩关节半脱位的脑卒中患者, 分别进行两种贴扎方法(方法一: 肩部贴扎法; 方法二: 肩肘贴扎法)治疗, 随即采用第二肩关节间隙X线测量法进行评估。结果: 患者经过贴扎术治疗后, 方法一无明显改善($P>0.05$); 方法二患者肩关节间隙显著缩小($P<0.05$), 治疗前后关节间隙差值为 $7.80\pm 2.97\text{mm}$, 两种方法治疗前后关节间隙差值有显著性差异($P<0.05$)。结论: 肩肘贴扎法对脑卒中患者的肩关节半脱位具有良好的即时疗效, 可为早期的脑卒中患者纠正肩关节半脱位提供一种新的治疗方法。

关键词: [贴扎](#) [脑卒中](#) [肩关节半脱位](#)

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

您是本站第 2806088 位访问者

版权所有: 中国康复医学会

主管单位: 卫生部 主办单位: 中国康复医学会

地址: 北京市和平街北口中日友好医院 邮政编码: 100029 电话: 010-64218095 传真: 010-64218095

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计 京ICP备10000329号