

神经科用药专栏

长春西汀治疗脑卒中后认知障碍30例

沈涛

江苏省无锡市长江康复医院,214026

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 目的探讨长春西汀对脑卒中后认知障碍的疗效和作用机制。方法将60例脑卒中后认知障碍患者随机分为治疗组和对照组各30例。治疗组给予长春西汀氯化钠注射液 20 mg静脉滴注,qd,连续 15 d为1个疗程;对照组给予5 %葡萄糖注射液(或0.9%氯化钠注射液) 250 mL+胞二磷胆碱注射液0.75 g静脉滴注,qd,连续15 d为 1个疗程。治疗第15 天进行简易精神状态评分(MMSE)和Blessed Roth痴呆量表评分。结果治疗组患者第15天MMSE和Blessed Roth痴呆量表评分均高于治疗前和对照组(均 $P<0.05$ )。结论长春西汀能有效改善脑卒中后认知障碍患者的认知功能、社会活动功能及日常生活能力。

**关键词** [长春西汀](#) [认知障碍,脑卒中后](#)

分类号

**DOI:**

对应的英文版文章:[2009-2-195](#)

通讯作者:

作者个人主页: 沈涛

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (1146KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“长春西汀”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [沈涛](#)