

◎ 会员登录

用户名:

密码:

验证码:

0 B 4 6 H 看不清?换一张

◎ 快速通道

作者投稿

作者查稿

编辑审稿

专家审稿

期刊摘要

> 您当前的位置:网站首页→期刊摘要

运动想象疗法对脑卒中偏瘫患者步行能力的影响 [点此下载全文](#)

王鹏, 马朝阳, 游菲, 熊修安, 万文俊, 王颖, 张婷

武汉, 武汉市中心医院康复科

基金项目:

DOI:2014年05期

摘要点击次数: 51

全文下载次数: 45

摘要:

目的观察常规康复治疗联合运动想象疗法对脑卒中偏瘫患者步行能力的影响。方法采用随机数字表法将80例脑卒中偏瘫患者分为治疗组(40例)及对照组(40例)。2组患者均给予对症药物治疗及常规康复干预,治疗组在此基础上辅以运动想象疗法。于治疗前、治疗6周后对2组患者10 m最快步行速度(10m MWS)、跨步长、步频进行检测,同时采用Fugl-Meyer运动功能量表(FMA)下肢部分、Holden步行功能分级(FAC)对2组患者步行功能进行评定。结果治疗前2组患者各项指标组间差异均无统计学意义($P > 0.05$)。分别经6周治疗后,发现2组患者各项指标均较治疗前明显改善($P < 0.05$),并且治疗组各项指标[该组10m MWS为 (0.53 ± 0.20) m/s,跨步长为 (78.91 ± 20.46) cm,步频为 (78.10 ± 12.03) 步/分钟,FMA下肢评分为 (24.13 ± 5.77) 分,FAC分级为 (3.60 ± 1.01) 分]改善幅度均显著优于对照组水平[该组10m MWS为 (0.42 ± 0.15) m/s,跨步长为 (69.75 ± 18.31) cm,步频为 (71.14 ± 9.29) 步/分钟,FMA下肢评分为 (20.65 ± 4.70) 分,FAC分级为 (2.93 ± 0.89) 分],组间差异均具有统计学意义($P < 0.05$)。结论常规康复干预联合运动想象疗法可进一步提高脑卒中偏瘫患者步行能力,该联合疗法值得临床推广、应用。

关键词: 运动想象疗法; 脑卒中; 步行能力

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

版权归《中华物理医学与康复杂志》编辑部所有

本站原创及转载的文章、资料,其版权均由本站及原作者或原刊载媒介所拥有;未经版权所有人同意,任何机构或者个人不得擅自将其作为商业用途。

地址:武汉市解放大道1095号同济医院 邮编:430030

电话:(027)83662874 传真:83663264 E-mail:cjpmr@tjh.tjmu.edu.cn

本系统由武汉市凯思科技发展有限公司设计开发