中國庸复医学杂志

合 设为首页 加入收藏 II 联系我们

CHINESE JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE

首页 | 杂志介绍 | 编委成员 | 投稿指南 | 订阅指南 | 过刊浏览 | 广告投放 | 论著模板 | 综述模板 | 帮助

赵玲, 陈松兰, 陈洪昌, 冯勇. 食管癌患者术后康复硬膜外自控镇痛的应用研究[J]. 中国康复医学杂志, 2006, (2): 167-168

食管癌患者术后康复硬膜外自控镇痛的应用研究 点此下载全文

赵玲 陈松兰 陈洪昌 冯勇

广州工伤康复医院,广州工伤康复医院,广州工伤康复医院,泰山医学院附属医院 广州从化,510970,广州从化,510970,广州从化,510970,泰安市泰山大街西段,271000

基金项目:

DOI:

摘要点击次数: 94 全文下载次数: 117

摘要:

目的: 促进食管癌患者术后的顺利康复。方法: 175例食管癌患者术后采用硬膜外自控镇痛的方法(PCEA组), 观察患者术后镇痛效果、咳痰情况、肺部感染、导尿管留置时间及住院天数, 并与常规肌肉注射镇痛剂的患者153例进行对比研究(MI组)。结果: PCEA组镇痛效果满意率是93. 7%; MI组是43. 1%(P<0.01)。咳痰情况PCEA组良好者占72. 0%, 较好者占24. 0%, 不良者占4. 0%; MI组分别为39. 9%、41. 2%、18. 9%(P<0. 01)。 PCEA组肺部感染的发病率是14. 9%; MI组则是24. 8%(P<0. 01)。术后患者导尿管留置时间, PCEA组为3. 65±0. 51天; MI组为2. 51±0. 63天(P<0. 01)。住院天数PCEA组和MI组分别是13. 7±1. 52天、17. 6±2. 95天。结论: 食管癌术后应用硬膜外自控镇痛的方法能够有效的促进患者术后顺利康复。

关键词:食管癌 硬膜外自控镇痛 康复

Download Fulltext

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

查看全文 查看/发表评论 下载PDF阅读器

您是本站第 312359 位访问者

版权所有:中国康复医学会 主管单位:卫生部 主办单位:中国康复医学会

地址: 北京市和平街北口中日友好医院 邮政编码: 100029 电话: 010-64218095 传真: 010-64218095

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计